傷寒微旨論

傷寒九十論



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

傷寒微旨論

韓祇和撰

本館叢書集成初編所選墨海金壺及珠叢別錄皆收有此書墨海在先故據以排印

傷寒微旨提要

傷寒微旨二卷。宋韓祇和撰。是書、宋史藝文志不載。陳振孫書錄解題、載有其名。亦不著作者名氏。但據序題元祐丙寅。知其爲哲宗時人而已。今檢永樂大典各卷內、此書散見頗多。每條悉標韓祇和之名。而元戴良九靈山房集、亦稱自漢張機著傷寒論。晉王叔和、宋成無己、龐安常、宋肱、許叔微韓祇和、王賓之流。皆互有闡發。其間祇和姓名。與永樂大典相合。是祇和實北宋名醫。以傷寒爲專門者。特宋史方技傳不載。其履貫遂不可考。且書凡十五篇。間附方論。大抵皆推闡張機之旨。而能變通於其間。其可下篇、不立湯液。惟以早下爲大戒。蓋爲氣質羸弱者言。然當以脈證相參。知其邪入陽明與否、以分汗下。不宜矯枉過直。竟廢古方。至如辨脈篇。據傷寒例桂枝下咽、陽盛乃斃。衄氣入胃。陰盛乃亡之義。以攻楊氏之謬誤。可汗篇分陰盛陽虛、陽盛陰虛、陰陽俱盛三門。則俱能師張氏、而神明其意矣。又如汗、下、温、三法。分按時候辰刻。而參之脈理病情。乃因張機正傷寒之法、而通之於春夏傷寒。更通之於冬月傷寒。亦頗能察微知著。又如以陽黃歸之過下亡津。則於金匱發陽發陰之論。研析精微。不特傷寒之黃。切中緊要。即雜病之黃。亦可以例推矣。其書向惟王好古陰證略例中間引其文。而原本久佚。今採掇蒼粹。復成完帙。謹依原目釐爲上下二卷。陳振孫所稱之原序。則永樂大典不載。無從採補。殆編纂之時。舊本已闕歟。

傷寒微旨論卷上

宋 韓祇和撰

傷寒源篇

夫傷寒之病醫者多不審察病之本源。但只云病傷寒、卽不知其始自陽氣內鬱結。而後感熱病或冒冬至之後。一陽漸生。陽氣微弱。猶未能上行。易曰。潛龍勿用是也。至小寒之後、立春以前寒毒殺厲之氣大行。時中於人。則傳在臟腑。其內伏之陽。被寒毒所折。深浹於骨髓之間。應時不得宣暢。所感寒氣淺者。至春之時。伏陽早得發泄。則其病輕、名曰溫病。感寒重者、至夏至之後、眞陰漸發、其伏陽不得停留。或遇風寒、或因飲食沐浴所傷。其骨髓間鬱結者。陽氣爲外邪所引。方得發泄。伏陽旣出肌膚。而遇天氣炎熱。兩熱相干。卽病證多變。名曰熱病。按素問生氣通天論云。冬傷于寒。注云。冬寒且凝。春陽氣發。寒不爲釋。陽怫于中。與寒相持。故病溫。又熱論云。人之傷于寒也、則病熱。注云。寒毒薄于肌膚。陽氣不得散發、而內怫結。故傷寒者。反爲熱病也。以此證之、卽傷寒之病、本于內伏之陽爲患也。傷寒受足經篇云。人身有十二經絡。分布上下。故手有三陽三陰。足有三陽三陰。手三陽者。太陽小腸也。陽明大腸也。少陽三焦也。三陰者。太陰肺也。少陰心也。厥陰心包絡也。足三陽者。太陽膀胱也。陽明胃也。少陽膽也。三陰者。太陰脾也。少陰腎也。厥陰肝也。今傷寒之病。只受于足三陽三陰者。何也。熱論云。一日巨陽受之。頭項痛。腰脊強二日。

陽明受之。陽明主肉。故身熱目疼。而鼻乾不得臥。三日。少陽受之。少陽主膽。故胸脇痛而耳聾。四日。太陰受之。故腹滿而咽乾。五日。少陰受之。故口燥舌乾而渴。六日。厥陰受之。故煩滿囊縮。今經中論其傷寒病所傳受而不傳于手之三陽三陰。古今未見其說焉。且人之生也。稟天地陰陽氣。身半以上。同天之陽。身半以下。同地之陰。或四時有不常之氣。陽邪爲病。則傷于手經也。陰邪爲病。則傷于足經也。故寒毒之氣。則中于足經矣。易云。水流濕。火就燥。是也。太陰陽明論。陽受風氣。陰受濕氣。注云。同氣相求爾。又曰。傷于風者。上先受之。傷于濕者。下先受之。注云。陽氣炎上。故受風。陰氣潤下。故受濕。蓋同氣相合爾。至眞要大論云。身半以上。其氣三天之分也。天氣主之。身半以下。其氣三地之分也。地氣主之。注云。當陰之分。冷病歸之。當陽之分。熱病歸之。脈要精微論云。故中惡風陽氣受之也。以此爲證。卽寒毒之氣。只受于足之三陽三陰明矣。

傷寒半脈篇

夫傷寒既稟于冬。得春夏之氣。則欲發泄。而又因飲冷嗜欲則觸起。因衝風雨則迫動。因他人病所著。則外邪煦出內邪。既病之後。變動不常。未見于證。先形于脈。脈者人之權衡。浮數而軟。命之曰傷風。浮數而硬。命之曰傷寒。傷寒之脈。陽毒則頭大尾小。陰毒則頭小尾大。頭者寸也。尾者尺也。寸有餘則爲陽毒。尺有餘則爲陰毒。三部皆有餘。乍小乍大。爲往來未定。陽毒盛則解。陰毒盛則溫。陰陽皆盛則平。陰陽皆弱則扶。陰陽未定則待。既久不定。然後觀證。治傷寒以脈爲先。以證爲後。浮者按之便得。數者一息六至以

上硬者有力凡有吐瀉當以脈候關前脈大關後脈小或六脈俱大雖吐瀉大熱之證不得便以爲熱關前脈小關後脈大或六脈俱微雖秘結大寒之證不可便以爲寒經云關前爲陽關後爲陰

辨脈篇

夫辨傷寒病之脈不出于數種曰浮曰沈曰數曰遲曰陰曰陽先識此等六脈然後辨盛虛審大小察緊緩爲治病之急務今之醫流治傷寒病則憑脈浮爲陽脈沈爲陰全不明脈尺寸有陰陽虛盛之理爲可汗下與不可汗下之規往往變傷寒爲壞病焉

浮脈者皆謂舉之有餘及按之三四菽重得之也脈有三部有上部有中部有下部凡脈在上部者皆名浮也於傷寒病卽不然但病人兩手脈見之于皮外指到不及按便得者乃是浮也若病在表脈浮不得便以浮爲陽浮中亦有陽亦有陰也蓋三陰病在表脈亦浮也故有可汗者有不可汗者

沈脈者非謂深取而得之也若在中部上見卽爲沈矣但兩手脈按之至皮下得者乃是沈也傷寒病在裏三部脈沈不得便以沈脈爲陰沈中亦有陽亦有陰也假令三陽病在裏脈亦沈也故有可下者有不可下者

數脈者一息六七至是也病人脈或浮或沈若陰陽氣停脈雖及六七至只是邪氣傳受不宜妄投藥也若脈及七至已上按之有力卽可投藥解之此陰氣弱陽氣勝也

遲脈者一息四至下三至上是也病人脈或浮或沈不以大小緩急但見脈遲便可投藥和之此是陽氣

弱陰氣勝也。前數脈不投藥者。蓋數脈與陽病相應。何藥之有。今遲脈投藥者。乃是遏陰氣而歸于陽也。陽脈者。非謂脈浮爲陽也。病人兩手脈或浮或沈。皆以寸口爲陽也。若以在表爲陽。古人何以不云病在陽而云病在表也。平人氣象論曰。寸者陽分位也。脈經曰。從關至魚際是寸口內陽之所治也。又曰關前爲陽也。

陰脈者非謂脈沈爲陰也。病人兩手脈或浮或沈。皆以尺中爲陰也。若以在裏爲陰。古人何以不云病在陰。而云病在裏也。平人氣象論曰。尺者陰分位也。脈經曰。從關至尺是尺中內陰之所治也。又曰關後爲陰也。

盛脈者。非謂牢實洪滑也。是陰陽氣偏勝之名也。病人脈或沈或浮。不以大小緩緊。若寸口力大。名曰陽盛。尺中力大。名曰陰盛也。

虛脈者。非謂軟微濡弱也。是陰陽氣不足之名也。病人脈或浮或沈。不以大小緩緊。若寸口力小。名曰陽虛。尺中力小。名曰陰虛也。

大脈者。按之指下似洪而極大也。病人脈。三部力停。或在表。或在裏。按之雖大。若不發熱。冒悶。及口燥咽乾。譫語者。此是無表裏證。不可妄治之。治之。卽邪毒相攻爲壞病矣。

細脈者。比常脈小也。非微細之細也。若病人兩手三部脈力停。或在表。或在裏。其脈按之小或無力。雖陰脈先見。而證未見。便可少投溫藥和之。何者。蓋欲消陰氣歸於陽也。

緊脈者寒也。按之指下如繩動而無常是也。病人三部脈力停。或浮而緊。表傷寒也。或沈而緊。胃中寒也。若不惡寒不自汗。不胸滿。不腹痛。勿妄治之。此是傷於寒氣而傳受也。

緩脈者風也。按之指下軟差缺。病於遲是也。病人三部脈力停。或浮而緩。表傷風也。或沈而緩。亦胃中寒也。若不惡風不自汗。不嘔逆。不腹滿。亦勿妄治之。亦是傷於風而傳受也。

前辨脈之法。乃是病人始得病三四日以前。未經服汗下吐藥。即依前脈調理。免成壞病。若病人服汗下吐藥太過。變見別脈。及有壞病證。悉具仲景傷寒之論也。

陰陽盛虛篇

凡治傷寒病。先辨脈之浮沈。次于浮沈中。察寸尺之虛盛。何謂虛盛。病人兩手三部脈。或浮或沈。關前寸脈小。關後尺脈大曰。陽虛陰盛。關前寸脈大。關後尺脈小曰。陽盛陰虛。今之醫者則不然。皆云脈浮爲陽。豈可更言陰脈沈爲陰。豈可更言陽。執此偏見。枉陷病人。至于不救。難經云。五十八難曰。傷寒有汗出而愈。下之而死者。有汗出而死。下之而愈者。何也。夫陽虛陰盛。汗出而愈。下之即死。陽盛陰虛。汗出而死。下之即愈。楊氏曰。此說反倒。於義不通。不可依用。若反此行之。大爲順耳。楊氏即據脈經。辨脈。陰陽大法云。脈有陽盛陰虛。陰盛陽虛。何謂也。曰浮之損小。沈之實大。故曰陰盛陽虛。沈之損小。浮之實大。故曰陽盛陰虛。是陰陽虛實之意也。注云。陽脈見寸口浮而實大。今輕手按之。更損減而小。故言陽虛。重手按之反更實大而沈。故言陰實也。楊氏曲執此二端爲治傷寒病汗下之法。況脈經中。立此辨脈陰陽大法。蓋總

言雜病脈浮之損小沈之實大沈之損小浮之實大爲陰陽虛盛之說非爲傷寒病立言也傷寒病脈浮當以關前爲陽關後爲陰脈沈亦以關前爲陽關後爲陰也假令三部脈浮有可汗者有不可汗者若寸脈短小尺脈實大名曰陰盛陽虛乃可汗之汗之即愈若寸脈實大尺脈短小名曰陽盛陰虛不可汗之汗之即死三部脈沈有可下者有不可下者若寸脈實大尺脈短小亦名曰陽盛陰虛乃可下之下之即愈若寸脈短小尺脈實大亦曰陰盛陽虛不可下之下之即死今楊氏執難經正文爲汗下之誤又言文意反倒不可依用由其不通難經中陰陽二字迺是三部脈浮沈中寸爲陽尺爲陰非謂三部脈浮爲陽沈爲陰也使後人妄憑注中之說悞投汗下藥以害人命皆楊氏爲萬世之罪魁也蓋楊氏殊不達聖賢之意自擅己能謬傳於世故也且仲景傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡假令脈浮爲陽合投桂枝湯仲景何言陽盛則斃蓋謂三部脈浮寸脈力大關尺脈力小爲陽盛若投桂枝湯足以助陽爲毒是病人必死矣假令脈沈爲陰合投承氣湯仲景何言陰盛則亡蓋謂三部脈沈寸脈力小關尺脈力大爲陰盛若投承氣湯足以助陰爲毒是病人必亡矣此仲景汗下之戒正與難經陰陽虛盛文意同也則楊氏之失明矣病在表脈浮寸脈力小於關尺此爲陽虛陰盛雖三日以後至四五日亦可投發表藥若寸脈力大於關尺此爲陽盛陰虛雖未滿三日亦不可投發表藥投之則助陽爲逆病人三日以後病猶在表脈浮三部齊等尚不可投汗藥況寸脈力大于關尺耶病在裏脈沈寸脈力大于關尺此爲陽盛陰虛雖四日後亦可下之若四日以前雖有此脈未投下藥亦不爲晚若寸脈力小於關尺此爲陽

虛陰盛雖四日至六七日以後亦不可投下藥下之則助陰爲逆病人四五日以後病傳在裏脈沈三部齊等尙不可投下藥況寸脈力小於關尺耶

治病隨證加減藥篇

夫病證變壞急速者無出於傷寒古人以傷寒爲卒病也古今治傷寒無出於仲景方仲景尙隨證加減藥味量病而投之傷寒論辨太陽證小靑龍湯方內若渴去半夏加菝葜根微利若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓若喘去麻黃加杏仁又傷寒五六日中風往來寒熱者小柴胡湯方內若胸中煩而不嘔去半夏人參加菝葜根若腹中痛去黃芩加芍藥脇下硬去棗加牡蠣若心下悸小便不利去黃芩加茯苓若不渴外有微熱者去人參加桂枝若欬去人參棗薑加五味子乾薑又傷寒八九日風濕相搏桂枝附子湯方內若其人大便硬小便自利去桂枝加朮少許又少陰傷寒病二三日不已眞武湯內若欬加五味細辛乾薑若小便利去茯苓若下利去芍藥加乾薑若嘔去附子加生薑又霍亂理中丸方內若臍上築者腎氣動也去朮加桂吐多去朮加生薑下利多還用朮悸者加茯苓渴欲得水者加朮腹中痛加人參寒者加乾薑腹滿去朮加附子今據此五方中加減藥味之法乃是前賢訓誨人之深意也今之醫者見古方中有加減竟卽依方用之若方中無加減竟不能更張毫釐所謂膠柱也況素問有異法方宜論豈是執一端而治病也假令雜病方可用治傷寒病者亦可投之豈須待傷寒論中有法也況古人之心文筆不能盡言者多矣

用藥逆篇

病人若因服下藥太過。兩手脈沈細數。肢體逆冷。煩燥而渴者。乃是陽氣下陷入丹田。陰氣厥逆滿上二焦。故令人躁。此名陰躁也。醫者見病人煩躁、又不詢其端由。亦不詳其脈理。便用涼藥治之。涼藥得下。病勢愈甚。至於困極不救者多矣。病人若因下之太早。兩手脈沈遲細而無力。或遍身及四肢逆冷。煩躁而渴者。或引飲不休。好泥水中臥者。須用性熱藥治之。凡投性熱藥。皆須冷服。何故如是。蓋爲病人腹中陰氣太盛。若投熱藥湯劑。卽陰陽氣相擊。藥下必便吐出。須候湯劑極冷卽投之。投之不吐者。以腹中陰氣與冷飲相逢。卽同氣相求爾。故藥下不吐也。藥雖冷飲。久卽必發熱矣。所謂始同而終異也。素問云。醇酒冷飲。久必發熱。是也。假令投仲景四逆湯之類。一依前說。若病人不煩躁。卽熱藥可溫服之。

病人若傷暑熱。胃中空虛。飲冷太過。遂成泄利。日二三十往。大便色黃。米穀不化。渴飲水漿。醫者見此證。云。脾胃不和。故至此也。投熱藥或止之。或補之。熱藥既下。往往吐出。及下利愈甚。此亦陰陽氣相擊也。若處承氣湯之類。令病人熱飲之。藥既得下。必不吐出。亦是與胃中熱氣相從也。熱力既消。藥冷性得行。其病卽愈。素問注云。以蔥薑和粉藿投之是也。

可汗篇

傷寒病、有可汗者。論中。但統言其可汗證及可汗脈。或云。脈浮弱。或云。脈浮而數。或云。脈浮緊。或云。脈浮無汗而嘔。或云。脈浮而在表。今略舉數條。後人但憑脈之大緊。並不分脈浮有陰陽虛盛之理。又不分有

可汗有不可汗之處。慢投發表藥服之。則多變成陽毒之患。今舉病人有汗惡風。無汗發熱。分爲三等。及據立春以後。立秋以前。氣候輕重。各立方治之。庶學者易爲開悟耳。

病人一二日前。兩手脈浮數或緩或緊。按之差軟。寸關尺若齊等。雖有頭痛身熱。但只是邪氣傳于陽分。不可妄投發表藥也。

病人雖頭痛惡風身熱。若兩手脈、寸關尺三部齊等。其力不甚大不甚小者。亦未可便與解表藥。此是見表證、未見表脈也。直候寸脈力小於關尺。方可投解表藥。

大抵治傷寒病。見證不見脈。未可投藥。見脈不見證。雖少投藥、亦無害也。

凡治雜病。以色爲先。以脈爲後。治傷寒。以脈爲先。以證爲後。病人兩手脈浮數而緊。名曰傷寒。若關前脈力小。關後脈力大。惡風不自汗。此乃陰氣已盛。先見於脈也。若不調藥和之。後必惡風。及自汗出。若立春以後、至清明以前。宜調脈湯主之。清明以後、至芒種以前。宜葛根柴胡湯主之。芒種以後、及立秋以前。宜人參桔梗湯主之。

調脈湯

葛根一兩。防風去蘆半兩。前胡去苗三錢。甘草炙半兩。

右爲末。每服二錢。水一盞。生薑一塊如棗大。劈破。煎至七分。去滓溫服。如寸脈依前力小。加棗三箇。劈破同煎。

葛根柴胡湯

葛根一兩　柴胡一兩　芍藥二分　桔梗三分　甘草三分炙

右爲末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓熱服如寸脈依前力小加葱白三寸同煎服之

人參桔梗湯

人參三分　桔梗三分　麻黃去節一兩　石膏三兩　甘草三分炙

右爲末每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去滓熱服如尺脈依前力小加麻黃二分去節同煎服病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大惡風不自汗此亦陰氣已盛先見於脈也若不調藥和之後必惡風自汗出若立春以後至清明以前宜薄荷湯主之清明以後至芒種以前宜防風湯主之芒種以後立秋以前宜香苧湯主之

薄荷湯

薄荷一兩　葛根一兩　人參三分　甘草炙半兩　防風去蘆半兩

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服如三五服寸脈力尚小加薄荷二分

防風湯

防風去蘆半兩　桔梗三分　甘草炙　旋覆花各半兩　厚朴炒三分

右爲末每服三錢水一盞入薑一塊如棗大劈破煎至七分去滓熱服如三五服寸脈力尚小加荆芥

穗五七枚、同煎

香芎湯

川芎一分、石膏二兩、升麻三分、甘草半兩、厚朴半兩、

右爲末、每服三錢、水一盞、煎至七分、去滓温服。如三五服後、寸脈力尙小、加細辛二分。

前二段、又將中風傷寒各立法者、何蓋爲病人始得病、三日已前、因中風脈緩、或因傷寒脈緊、脈雖先見、而病證猶未見、尙可用藥解之、故各立方爾。

病人兩手脈浮數、或緊或緩、寸脈短、及力小於關尺脈者、此名陰盛陽虛也、若自汗出惡風者、是邪氣在表、陰氣獨有餘也、素問云、陰氣有餘、而多汗身寒、是也、卽可投消陰助陽發表藥治之、若立春以後、至清明以前、宜六物麻黃湯主之、清明以後、至芒種以前、宜七物柴胡湯主之、芒種以後、立秋以前、宜發表湯主之、

六物麻黃湯

麻黃去節一兩、人參、甘草各半兩、葛根、蒼朮各三分、

右爲末、每服三錢、水一盞、棗二箇、煎至七分、去滓熱服。如三五服已後、汗未止、加荊芥三分、如三五服後、不怯風、猶自汗出、加船上丁香皮半兩、

七物柴胡湯

柴胡二兩　蒼朮　荆芥穗　甘草　麻黃一兩去節各

右爲末每服三錢水一盞入薑一塊如棗大劈碎棗三箇劈破同煎至七分去滓熱服三五服後汗未止猶惡風者加葱白三寸如三五服汗猶未止加當歸一兩同煎服

發表湯

麻黃一兩半去節一　蒼朮三分　人參半兩　當歸半兩去蘆　舶上丁香皮　甘草各三分

右爲末每服三錢水一盞生薑一塊如棗大劈破棗三箇同煎至七分去滓熱服如三五服後汗未止猶怯風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止爲度

病人脈浮數或緊或緩其脈上出魚際寸脈力大於關尺此名陽盛陰虛若發熱冒悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問云陽氣有餘而身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春以後至清明以前宜人參湯主之清明以後至芒種以前宜前胡湯主之芒種以後至立秋以前宜石膏湯主之

人參湯

人參半兩　石膏二兩　柴胡一兩　芍藥　甘草各三分

右爲末每服三錢水一盞薑三片如錢大同煎至七分去滓熱服如三五服後依前發熱者每服水一盞半加豆豉十五粒同煎至八分如前熱未解更加石膏二兩

前胡湯

前胡一兩。石膏二兩。豆豉熬焦。三分。桔梗三分。甘草半兩。

右爲末、每服三錢、水一盞、薑一塊、如棗大、劈破同煎、至七分、去滓、熱服。依前熱未解、每服入豆豉三十粒、水一盞半、同煎至八分、去滓、熱服。

石膏湯

石膏三兩。芍藥一兩。柴胡一兩。升麻　黃芩　甘草各三分。

右爲末、每服三錢、水一盞半、入豉一合、煎八分、去滓、熱服。如三五服後、熱不解、加知母一兩。如熱未解、加大青一兩。

病人兩手脈浮數、或緊或緩、三部俱有力、無汗惡風者。此是陰陽俱有餘。素問云、陰陽有餘、則無汗而寒、是也。可用藥平之。若立春以後、至清明以前、宜解肌湯主之。清明以後、至芒種以前、宜芍藥湯主之。芒種以後、至立秋以前、宜知母湯主之。

解肌湯

芍藥二兩。麻黃去節。三分。升麻　甘草炙。各半兩。

右爲末、每服三錢、水一盞半、入豉半合、煎至八分、去滓、熱服。如三五服後、猶惡風者、加麻黃半兩、石膏一兩。

芍藥湯

芍藥　荊芥穗各一兩　石膏三兩　甘草炙半兩

右爲末、每服三錢、水一盞、薑一塊、劈破同煎、至七分、去滓、熱服。如三五服後、猶惡風、再加棗三箇、煎法如前。

知母湯

知母　麻黃去節升麻各一兩　石膏二兩　甘草半兩

右爲末、每服三錢、水一盞、入薑一小塊、同煎八分、去滓、熱服。如三五服後、猶惡風者、加麻黃半兩。

仲景云傷寒爲病、脈緩者名中風、脈緊者爲傷寒。蓋始因經冬溫毒毒氣中其人、內伏之陽、沈潛于骨髓之內、每至春夏發時、或因外傷寒而引內邪出、及乎內邪既出、卽爲病一也。故古人立此二端、恐後人疑其緊脈與緩脈治法別也。若中風與傷寒脈異、何故仲景無別法治之。此乃後人不究仲景之心也。前二段、又將中風與傷寒以一法治之者何。蓋病人始得病後、脈與證俱見、若投解利藥、必不能愈、故立前方同法治之。病人始得病一二日、至五六日、尙有表脈及表證者、亦可依脈證投藥。凡投解表及發表藥、每一日可飮三服。病甚者可至五服外、不可頻投藥也。如證未解、可投熱粥、內加葱白亦佳。如有汗出、勿厚衣蓋覆、恐出汗太過、作亡陽證。

可下篇

傷寒病有可下者。論中但統言其可下證及可下脈。或云下利、三部脈皆平、心下硬。或云下利脈遲而滑

者內實。或云脈滑而數者。有宿食。或云脈沈者內實。或云脈滑內疾。或云脈浮大按之反濇。有宿食。或云脈實者。今略舉此數說。後人但憑其脈之大綱。卽不分脈沈有陰陽虛盛之理。又不分有可下有不可下之處。愎投下藥。終則變成四肢逆冷。手足拘攣。嘔逆喘滿之患。

病人四五日以後。兩手脈沈數。按之不甚實。若三部力齊等。雖有發熱冒悶。只是邪氣傳于內。潛在胃脘。不可妄投下藥也。若投黃芩湯三服以解之。卽可。

病人五六日。兩手三部脈沈數大。按之不斷。寸脈上湧。力大于關尺脈。此名陽盛陰虛。可大小承氣湯。以助陰消陽也。若腰重、口乾、譫語、項背以上濈然汗出。時時潮熱者。可服調胃承氣湯。若第四五日見此證脈。可服小承氣湯。

病人三四日以後。兩手三部脈沈數。寸脈斷、力小、關尺脈力大。此名陰盛陽虛。切不可投下藥。宜據溫中篇內湯丸投之。以助陽消陰也。

病人兩手三部脈沈數。按之至骨。有力而不斷。口燥咽乾而渴、時時發熱冒悶者。此是陰陽氣俱實。可用藥和之。宜黃芩湯主之。

黃芩湯

黃芩　甘草　山梔子　芍藥　厚朴　花粉等分。

右爲末、每服二錢、水一盞、煎至七分、去滓、溫服。如脈力差軟、住服。若大便溏、去梔子、加葛根等分。若立

春以後、立夏以前、見證者、去梔子芍藥、加柴胡、去苗、等分。

病人兩手脈沈數大、按之不斷、寸脈上湧力大於關尺者、此名陽盛陰虛、可投藥下之、以助陰消陽也、若立春以後、至清明以前、可下者、小承氣湯內、更加厚朴半兩、減大黃一兩、主之。若發熱譫語引飲者、小承氣湯、清明以後、芒種以前、可下者、小承氣湯主之。若發熱、冒悶、腰重、引飲、時時譫語、大承氣湯、芒種以後、至立秋以前、可下者、大承氣湯主之。若發熱煩燥、腰重、譫語、頭面濈然有汗者、調胃承氣湯主之。凡用大小承氣、及調胃承氣、並用仲景方。

病人立春以後、至芒種以前、第三四日、雖有可下證、及有可下脈、亦未可便投下藥、直候至第五日、或第六日、投下藥者何、蓋天氣陽力尙微、慮下之太過、變成壞病也、若芒種以後、立秋以前、雖第二三日、有可下證、及有可下脈、亦未可便下之、直候至第四五日下之、天氣炎盛、與胃中熱氣相干、雖第四五日投下、必不能成後患也。

凡投下藥、不得務急爲勝、假令今日寅時、投下藥、至申時酉時不動、可再投下藥、假令今日酉戌時投下藥、至來日雞鳴時不動、再可投下藥、切宜愼守也。

病人三四日以前、切不宜早下、早則多成結胸、及四逆之患、至十二日以後者、見有下證、雖脈不至實盛、亦宜下之、假令第十二三日投下藥之後、至十六七日、尙口燥咽乾譫語者、卽更宜下之、何者、蓋爲陰病、不過六七日乃劇、若陽病、至十三日以後、頻投下藥、無害也、今立此言者、恐醫流將病人日數淺深、一槩

治也。且今太平久矣。臟腑柔脆。故氣血虛弱。但遲投下藥。亦無害耳。

病人四五日以後。假令今日寅時。見下證及有可下脈。未可便投下藥。更候之午未時間。陽氣盛。再看其脈。若比寅時寸脈力倍大於關尺脈。卽可下之。若與寅時脈力平同。卽候次日投下藥。亦不爲晚矣。凡投下藥者。最其脈力輕重。證之深淺。不可下之太過。若太過。則病證多變。且古人立論。無失下之過。但罪其下之太早及太過爾。況病人七八日不大便。古人未嘗罪醫者投下藥之晚。此醫之深意思。後人全不通曉。

病人第五六日。兩手三部脈沈數。寸關尺力齊等者。此乃陰陽氣停。雖然咽乾、腰重、發熱、亦不可投下藥。當大便自下爾。

病人至六七日不大便。若其兩手寸脈小。尺中脈大。亦不可下之。雖不服下藥、而大便者。則必先硬而後溏。蓋由腹中有陰氣也。仲景論曰。先硬後軟。不可攻也。況鴨溏乎。

傷寒論中。或云。按之心下堅。腹中滿。不大便、口燥、咽乾、汗出、譫語、日晡時發潮熱、不能食、體重氣促、濈然汗出。皆是可下之證。雖有此可下之證。若三部脈停力弱。及寸脈小于關尺。此爲有下證無下脈。不可下之。毫釐千里。直候寸脈力大于關尺。可下也。凡投下藥、只參酌仲景承氣湯輕重用之。

治傷寒病。投下藥者。本不爲取積及取食。止爲疎解陽毒之氣。若邪毒在內。陽氣盛。卽寸脈大。乃可下之。其陽氣不盛。卽三部脈停。何必下之。蓋今人只知沈在裏。便投下藥。殊不較量脈之陰陽虛盛也。

凡投下藥者。本因胃中有邪熱之氣。故投大黃芒硝之類。以消陽氣。今之醫者。絕不解古人下傷寒之法。多投以丸藥。丸藥多用巴豆、水銀、膩粉、粉霜、砒霜、甘遂、石腦油之類。皆是熱藥。但能逐其胃中濁惡。即愈增其邪熱矣。今用丸藥下傷寒病者。欲去胃中積聚。胃氣既虛。即邪熱在內。又與熱相逢。及吐納暑熱之氣。足以助陽爲毒。後成壞病也。

今人投下藥纔見大便利。及三五次。急投和氣藥以補之。本意用大黃等涼藥。疏導胃中熱氣。熱氣纔過。乘虛之際。却投和氣補熱藥。決然變成發黃斑、出衄血、畜血、狂走之患矣。

凡投下藥、候四五日以後。有下脈及有可下證。即可下之。假令病人不投下藥。至六七日大汗後。依然腰痛、咽乾而渴。日晡發熱。頰赤。胸中冒悶。兩手脈實而數。宜用黃芩湯一兩服和之。直候大汗出後。至第五六日。投大承氣湯或調胃承氣湯。亦無害。蓋于汗後至第五六日。投下藥者。是因病人大病後。氣血虛弱。不可早下也。

前可汗篇。別立方藥。而不從仲景方。今可下篇中。不別立藥。而從仲景方者何。蓋太平之人。飲食動作過妄。作陽氣多。若用大熱藥發表。則必變成壞病。故斟酌重輕而立方也。世人陽氣即多。若用下藥當從至陰藥投之。非仲景承氣湯之類。即別藥不能對病矣。請醫者深詳之。

傷寒微旨論卷下

總汗下篇

凡治傷寒病。若能辨其汗下者。卽治病之法。得其十全矣。今之醫者則不然。但憑其熱論云。未滿三日。可汗而已。其滿三日者。可泄而已。又云脈大浮數。病爲在表。可發其汗。脈細沈數。病爲在裏。卽可下之。此古人立理之綱維。而今人執之爲定法。又全不辨脈尺寸之陰陽。邪氣之虛盛。及內外證之輕重。但未滿三日。卽投發表藥。已滿四日。卽投下藥。其間或有辨脈之浮沈。投汗下藥者。以爲能事矣。殊不知未滿三日亦有可下者。已滿四日後。亦有可汗者。又不知脈浮有不可汗者。脈沈有不可下者。熱論云。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛、腰脊強。二日陽明受之。陽明主肉。故身熱、目疼、而鼻乾、不得臥。三日少陽受之。小陽主膽。故胸脇痛而耳聾。三陽經絡、皆受其病。未入於臟。故可汗而已。四日太陰受之。故腹滿而咽乾。五日少陰受之。故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之。而囊縮。此三陰三陽受病之日。乃是聖人立條目之法。不必一日巨陽。二日陽明爲次也。但會三陰三陽所直之日。與邪氣相逢。各相有形證也。假令一日。或耳聾、或鼻乾、或頭痛、或腹滿、或舌乾而渴、或囊縮。此是邪氣隨陰陽之經絡所傳也。餘日放此。雖見此三陰三陽病證。若兩手三部脈、或浮或沈。寸關尺力齊等者。不得妄投發表藥。及投下藥。當候兩手脈浮沈中或關前大關後小。或關前小關後大。此是陰陽氣之偏勝。卽依脈證投藥治之。仲景傷寒論。

傷寒例云尺寸俱浮太陽受病也尺寸俱長陽明受病也尺寸俱弦少陽受病也尺寸俱沈細者太陰受病也尺寸俱沈者少陰受病也尺寸俱微緩者厥陰受病也此亦是因邪氣傳受三陽三陰之經故見此脈亦不可妄投發表藥及投下藥當候兩手脈浮沈中或關前力小關後力大或關前力大關後力小此亦是陰陽氣之偏勝即依脈證投藥治之且黃帝作三陽三陰證在前仲景述三陽三陰脈在後本爲邪氣所傳故設此語非務求法治之恐後人慢投藥也今人纔見病人有此三陰三陽病證及脈便急投藥求命則失之遠矣熱論云七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縮少腹微下大氣皆去病日已矣且傷寒病若見三陽三陰證及脈合用藥調治古人何言大氣皆去病日衰矣即知是不須用藥妄調治也仲景傷寒論辨太陽證云太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也又曰十二日厥陰病衰大氣皆去病人精神爽慧矣且素問經中黃帝與岐伯問答病證莫知其數皆各立法治之惟熱論中傷寒病最爲大疾卻至七日太陽病衰又云大氣皆去若是傷寒病須用法調治即聖賢皆不言自愈也今之醫者纔見人病傷寒多不辨脈之理趣又不分證之是非便妄投藥以調治往往變成壞病至於橫夭誠可傷也

傷寒病稱可汗者非謂病人三日以前也蓋謂邪氣在表或陰氣勝於陽氣即寸口脈力小於關尺令人惡風或自汗出即可投發表藥以助陽消陰若陽氣勝於陰氣即寸口脈力大於關尺令人發熱冒悶可

投解表藥、以助陰消陽。非謂求汗出爲愈。若邪氣在表。脈浮。三部力齊等。惡風。不汗出、不冒悶發熱。又何必投發表及解表藥也。

傷寒病稱可下者。非謂病人第四日以後也。但見邪氣在裏、伏於胃中。或陽氣勝於陰氣。卽寸脈力大於關尺。令人口燥。咽乾、腰重、發熱甚至於譫語。可投大黃等藥以助陰消陽。若邪在裏。陰氣勝於陽氣。卽寸脈力小於關尺。令人胸滿悶。時或嘔吐。可投溫中藥以助陽消陰。不可求取積爲愈。若邪氣在裏。脈沈。三部力齊等。不譫語。不口燥咽乾。不胸腹滿悶。又何必投藥下之。及溫中藥也。

世人爲見素問云。三日以前可汗。四日以下可下。乃執爲定法。今深戒醫流、不可將病人三日以前、妄投汗藥。四日以後、妄投下藥。切宜愼守仲景云。發汗吐下之相反。其禍至速。信矣。且古之聖賢立汗下二字。本謂調解陰陽偏勝之氣。而今醫者、執汗下二字。妄爲主治傷寒求愈之功。則失之遠矣。況仲景治傷寒病。未嘗有失汗下之戒。失下之過。但責其下之太早耳。此仲景之心也。後人或各擅家技。或自恃己能。殊不究仲景心萬分之一。誠可罪焉。

辨汗下藥力輕重篇

凡醫者治傷寒病。遇其邪氣在裏。並不分邪氣之輕重。脈理之虛盛。只憑脈浮。便將發表藥一例投之。務期汗多爲快。藥力過劑。遂致衄血、吐血、發斑、汗漏、四肢拘攣、因成亡陽之患也。

病人無汗發熱。三部脈浮。寸脈大於關尺者。此是陽盛陽邪旣盛。若入於胃中。卽變成瘀熱之患。當用解

表藥、以消陽氣。解表藥者。石膏甘草芍藥生薑豆豉薄荷柴胡葛根之類是也。

病人汗出惡風。脈浮。見陰盛者。可投發表藥消陰氣。發表藥者。桂枝、麻黃、荊芥、棗、葱、當歸、附子、乾薑之類是也。但不可全用桂枝耳。

凡投發表藥。只要消解陰勝之氣。不務汗多爲法。若汗出太過。則成亡陽之病。仲景桂枝湯證云。令遍身漐漐然。微似有汗。不可如水流漓。今既見可汗證。當投發表藥。古人何故卻云。汗不可如水流。足知發表藥。不謂汗多爲愈也。

凡醫者治傷寒病。遇其邪氣在裏。並不分邪氣之輕重。脈理之虛盛。只憑脈沈。便將下藥一例投之。務期大便快利爲法。既過劑。遂成噫噦嘔吐。四肢逆冷及拘攣之患。

病人發熱。冒悶或譫語。脈見陽盛者。可投下藥。以消陽氣。陽氣既消。則無忽變之證。消陽藥者。大黃、芒硝、梔子、甘草、枳實之類是也。如用大黃芒硝。須用少兼厚朴以和之。若一服未中。再服之。不可務期快利。切宜愼守也。

凡投下藥。只要消陽毒之氣。不務取積爲快。今既見可下證。古人何故卻罪下之太早及太過。足知不務快利爲法也。

今立此篇。較量藥力輕重者。蓋謂醫流執守古方。不能隨形證淺、深、增減藥味也。若能辨藥輕重。隨證用藥。何慮太過不及之責也。葛氏肘後篇曰。傷寒有數種。初覺。作葱豉湯頓服。取汗。如不汗。加葛根升麻。更

作加麻黃豉湯。以此較之。卽古人豈一端而治病。故具輕重。出此篇以明之。

温中篇

夫傷寒病之說。始黃帝以開其端。由至於仲景方陳其條目。自後膚淺之學。莫知其數。立言者。只云病在表可發汗。病在裏可下之。或云不可汗。或云不可下。未嘗有温中之說。仲景傷寒論云。尺寸俱沈細。太陰受病也。尺寸俱沈。少陰受病也。尺寸俱微緩。厥陰受病也。又辨太陰證云。病脈浮。可發汗。宜桂枝湯。又自利不渴。宜四逆湯。又腸滿時痛。桂枝加芍藥湯。辨少陰證云。少陰病。始得之。發熱脈沈。麻黃附子細辛湯。少陰證二三日。麻黃附子甘草湯。又少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沈。附子湯。又少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死。吳茱萸湯。又少陰病。脈沈。急温之。宜四逆湯。今舉仲景論中數條。最是治三陰病之良法。於今世之用。尙有未盡證者。愚嘗校讎。自至和初歲。迄于今三十餘年。不以歲之太過不及。每夏至前。以有病傷寒人。十中七八。兩手脈俱沈細數。多是胸臆滿悶。或嘔吐。或氣塞。或腹鳴。或腹痛。與仲景三陰病之說脈理同。而證不同。因不敢妄投仲景治三陰病藥。醫者纔見脈沈及胸脇滿。便投藥下之。往往不救。嘗斟酌仲景理中丸與服之。其病勢輕者。卽胸中便快。其病勢重者。半日許悶依然。或有病人脈沈細遲。故仲景四逆湯温之。多藥力太熱。後必發煩躁。因較量此形證。今別立方以治之。多得對病。不可不傳焉。

按王好古陰證略例云。此一條非四逆熱而不當也。仲景當漢末。韓氏當宋隆時。勢異也。

病人但兩手脈細數。或有力。或無力。或關脈短及小者。胸中膈塞。悶。氣不能相接者。便可隨證與脈投温

中藥以治之。（按王好古云：此一條法甚活。）

病人兩手脈沈遲。或緩或緊。皆是胃中寒也。若寸脈短。及力小于關尺脈者。此是陰盛陽虛也。或胸膈滿悶。腹中脹痛。身體俱急。手足逆冷。急宜温之。若立春以後。至清明以前。宜温中湯主之。清明以後。至芒種以前。宜橘皮湯主之。芒種以後至立秋以前。宜七物理中丸主之。

温中湯

舶上丁香皮　厚朴兩。各一　乾薑　白朮　陳皮　丁香枝分。各二

右爲末。每服二錢。水一盞。入葱白三寸。荆芥五穗。煎至七分。去滓。熱服。如三服未快。及手足逆冷。嘔吐。更加舶上丁香皮二分。乾薑一分。炮。

橘皮湯

陳皮　厚朴兩。各一　藿香分。三　白朮　葛根分。各二

右爲末。每服二錢。水一盞。入薑一塊。如棗大。劈破。同煎至七分。去滓。熱服。如兩三服後未快。手足逆冷。嘔吐不止。加半夏三分。丁香枝半兩。加葱白三寸同煎熱服。

七物理中丸

人參分。三　生薑屑兩。二　藿香分。三　白朮兩。二　桔梗分。三　葛根分。二

右爲細末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。水一盞。煎至七分。和滓熱服。如兩三服後未快。及手足逆冷嘔

吐加半夏二分乾薑二分炮

病人兩手脈沈細無力雖三部脈力停亦是陰氣盛也更不須候寸脈短治之或胸膈痛身體拘急疼痛手足逆冷宜用温中藥和之按王好古云此一條不須候寸脈短一句難解當云三部既沈便是無寸口也若立春以後至清明以前宜厚朴湯主之清明以後至芒種以前宜白朮湯主之芒種以後至立秋以前宜橘葉湯主之按王好古陰證略例舉和解因時一說與韓氏相似然湯液四時之法因已備耳若應見違時只可隨應見而治之海藏云仲景既言春爲温病夏爲熱病長夏爲大熱病隨經之藥加減輕重便爲因時和解也至治應見便是活法韓李因時定藥是時然矣證復違時定藥難用若用定藥卻是不應時也假令立春清明芒種立秋即歲之主氣也定時也若歲之客氣司天在泉太過不及勝復淫至而不至未至而至豈可定時爲則邪主氣爲病則只論主氣客氣爲病則只論客氣主客相勝上下相召有萬不同之變人之稟受虛實亦猶是也以此言之則仲景六經之言盡矣但患時氣醫者不知耳此亞聖言簡而意有餘也後之賢者辭多而意少務救一時之弊此韓李爲是因時一說也是說也又爲庸醫執方療病者設非敢爲仲景別立一法也噫二公雖一時之足爲漢之仲景亦足以爲今之仲景也

厚朴湯

當歸 丁香枝 厚朴 甘草 乾薑各半兩 細辛一分 人參三分

右爲末煉蜜於丸如彈子大每服一丸水一盞煎至七分和滓熱服如三五服後脈尚細及寸脈未爲力加葱白三寸同煎按王好古陰證略例云此一條言寸脈小者陽不及九天也加葱以通經

白朮湯

白朮 半夏 當歸 厚朴 生薑屑各半兩 舶上丁香皮三分

右爲末每服二錢水一盞入生薑一塊如棗大劈破同煎至七分去滓熱服如三五服後未有力及寸

脈力尙小。加細辛半兩。葱白三寸。同煎服。

橘葉湯

橘葉　半夏　厚朴各半兩　藿香　葛根

右爲末、每服三錢、水一盞、入薑一塊、如棗大、劈破同煎、至七分、去滓熱服。如三五服後、脈力尙小、手足通冷、加細辛三分。

病人胸膈滿悶時時嘔逆。支節疼。兩脇下痛。腹中鳴。此是停飮。宜二苓湯主之。

二苓湯

赤苓　豬苓　白朮　桂枝各半兩　滑石一兩　白豆仁　通草各一分　丁香皮三分　陳皮三分

右爲末、每服三錢、水一盞、煎至七分、去滓熱服。小便未快、加瞿麥三分。嘔未止、加半夏半兩。寒甚、加葱白三寸。按王好古云。此與李思訓調小便例同。

病人八九日後、服汗下藥太過。兩手脈沈細而無力。好蹉足臥。多惡明與人聲。身有粟起。時時發戰。一如瘧證。宜羊肉湯主之。

羊肉湯

當歸　牡蠣　芍藥各一兩　龍骨半兩　桂枝去皮二分　黑附子二箇每箇五錢重泡去皮臍

右杵爲粗末、每服用末二兩。羊臛肉四兩。生薑二兩。葱白五寸。同剉爛。以水五升同熬。至二升半。以來。

淨絞去滓。分作三盞服。

病人服藥胸中滿者。此是上焦有陽也。或藥力太過。上焦覺氣熱、腹滿、虛鳴、時時疗痛。此是被陽藥消逐上焦。陰氣併入下焦也。雖是下焦積寒。今上焦陽盛。更難投温下焦藥也。當用炭灰或桑柴灰二三升許。入好醋拌和、乾濕得所。於銚內炒令灰熱。以帛包裹。置臍下熨之。頻換灰包。常令熱。以腹不痛爲度。或初用灰熨。病人不肯受者。勿聽。但令極熨之。勿住灰包。如因灰包熨後得下利一兩行。或小便二三升。或微有汗。此是陰氣外出、或下泄也。當勿疑之。病輕者乃得瘥愈。

病人三部脈沈。寸脈力小於關尺。爲陰盛。當投温中藥。以消陰氣。温中藥者。厚朴、橘皮、人參、白朮、藿香、當歸、乾薑、細辛之類是也。按王好古陰證略例。海藏云。霜露山嵐雨滋霜霧之氣而飲冷。寸口脈小同證一體。病人若因服下藥太過。即手脈沈細。躰肢厥逆冷。煩躁而渴者。此是陽氣下陷入丹田。陰氣厥逆滿上二焦。故令人躁。此名陰躁也。醫者見病人煩躁。不詢其端由。亦不詳其脈理。便用涼藥治之。涼藥既下。病勢愈甚。至于困極不救者多矣。病人因下之太過。兩手脈沈澁細而無力。或遍身及四肢逆冷。煩躁而渴。或引飲不休。好泥水中臥者。須用性熱藥治之。凡投性熱藥。皆須冷服。飲或如是。蓋爲病人腹中陰氣太盛。若投熱藥湯劑。即陰陽相爭。藥下即吐。須候湯劑極冷。即投之。投之不吐者。以腹中陰氣與冷飲相逢。即同氣相投耳。故藥下不吐也。藥雖冷。久取必熱。所謂始同而終異也。故醇酒冷飲。久即發熱。假令投仲景四逆湯之類。一依前說。若病人不頓躁。即熱藥可温服之。如躁渴引飲不休。雖强冷只好飲冷同意。此一條本是陽證下之成陰。非陽氣上行而躁。乃陽氣下陷而躁。即同伏陽脈也。叔和云。短脈陰中有伏陽。海藏云。熱藥冷服。內有伏陽。則可。若脈已虛。按之全無力。或病人素無所養。只可温服。不然。陰氣必不能釀回陽和害非輕。

小便大便篇

治傷寒病。常調解病人小便流利。及色不黃赤。最爲醫之大要也。

病人二三日以後。頻體問病人。無令小便黃赤色。及淋瀝。纔似小便少及黃色。卽據證。便投藥以調治之。切勿令凝滯也。病人邪熱積於胃中。又遇天氣炎盛。內外熱氣相干。併走於下焦。流下入膀胱。爲熱所結。卽滲漉過遲。故小便因而色黃赤及澀少也。若熱發甚。則藥力愈難通也。傷寒論曰。熱結膀胱。其人如狂。病人小便色或變黃。雖未赤澀。便可投瞿麥湯。日二三服。亦無害也。

凡治病傷寒。常令放行小便。勿令放行大便。況小便難導也。而大便易導也。假令陽明病。胃中熱實。止不過調胃承氣湯投之。藥旣得下。泄去熱毒之氣。不爲難也。假令小便凝滯。若證輕。尙慮快藥之勿及。況證重乎。此乃傷寒要妙之門。不可不思之。況古人無失下之過。無禁小便之法。何今人不究其深趣也。

瞿麥湯治病人二三日以後至未大汗以前。若小便黃色者。

瞿麥　扁蓄　豬苓　黃芩　茯苓各一兩　木通半兩　滑石三兩　甘草三錢　通草一錢

右爲末。每服三錢。水一盞。同煎至八分。去滓。放温涼時乃服。若覺渴或發熱。加蔗蘸根一兩。若小便赤色。加黃芩半兩。若小便少。加車前子三分。若小便澀。如淋。莖中痛者。加石葦半兩。冬葵子三分。續隨子半兩。若臍下悸動。加茯苓半兩。桂枝半兩。並依前法服。

七物調中丸

白朮　乾薑炮各一兩　人參一兩　厚朴　舶上丁香皮各半兩

右杵爲末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。水一盞。棗二箇劈破。煎至六分。去滓。早服。

六物瀉心湯

黃連　半夏各一兩　甜葶藶炒　杏仁　乾薑各半兩　栝蔞實一枚劈如泥

右剉如豆大、合一處、分作六服、水三盞、煎至一盞半、淨紐去滓、放温、作兩次相續服、如半日胸中未快、及未通利、再投之、再煎藥成、傾在碗、入芒硝末三錢、攪勻去滓温服、取其快利也、

茯苓陷胸湯

茯苓　黃連各一兩　冬葵子　續隨子各一分　大黃　杏仁各半兩　半夏三分

右剉如豆大、合一處、每服半兩、水二盞、煎至一盞、淨紐去滓温服、如半日許未快利、更投一服、以胸中快及下利爲度、病人二三日、兩脈沈數微濇、寸脈不甚浮大、胸腹滿悶、按之不痛、宜服厚朴瀉心湯、

厚朴瀉心湯

半夏半兩　黃連　厚朴各一兩　乾薑　白朮各二兩　人參三分

右剉如豆大、分作八服、每服水二盞半、生薑二分、切爲片、同煎至一盞半、去滓、放温、兩次服、如半日許未得利、再一服、

畜血證篇

傷寒病有畜血證、自仲景立法之後、醫流未嘗有信其言者、逮仁宗朝、栄仲景法以治傷寒、其間遇病有畜血證、用仲景法治之、若與證相當、卽病無不愈、病人或太陽、或陽明證、至六七日、或表證未解、或狂、或

飢、或喜或妄或不大便。此乃瘀熱走於下焦。因而畜成積血。及令小腹滿也。傷寒論云。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。宜桃仁承氣湯。又論太陽病。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞕滿。小便自利。瘀熱在裏。故也。抵當湯主之。太陽病、身黃脈沈結、少腹鞕、小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯主之。又傷寒有熱。小腹悶滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。宜抵當湯。又陽明證。其人喜妄者。必有畜血。屎雖鞕。大便反易。其色必黑。宜抵當湯下之。又病人無表裏證。發熱至七八日。熱則消穀善飢。至六七日不大便者。有瘀血。宜抵當湯主之。仲景立此數方、治畜血。而云小便自利。乃血證諦也。病人本因瘀熱結在膀胱。即小便不利。但血逢瘀熱淖溢。而併走於下。遂積聚於下焦。血積既多。陽氣乃極。極則必反。陽氣既消。陰乃來復。血遇陰氣。凝結如豚肝。其血常冷。膀胱爲冷血所冰。乃滲瀉易過。即小便自利也。故仲景曰小便自利。血證諦也。

病人有畜血證。若現餘證。而小便未利。是陽氣尚盛。而血未足也。即未可便投湯丸治之。候小便利。乃可投藥。凡治畜血證。抵當湯丸方中。皆用蝱蟲水蛭及桃仁之類。盡是破血藥。若非此藥。則不能下之。今之用者。往往投之太過。蓋爲不審其病之輕重。與其人之老少強弱也。如遇畜血證。與仲景方對。即可全用其法治之。若病勢少輕。人又老弱。倣倣抵當湯丸。別用破血藥治之亦可。知此變通。庶免後患。　熙寧五年壬子。長安縣君李氏年六十餘。自來瘦弱。患傷寒病至第九日。變成畜血。來召。及到診之。兩手脈沈遲細。力微。膚冷。小腹滿。昏迷不省人事。再三詢其所由來。其主病者云。自得病後。服發汗藥。至第六日喜

妄發狂至第八日身體冷臍下滿昏迷失次既得此言知爲畜血證矣又問病人曾遺小便否曰病後小便常不利愚甚疑之因用紙針內其兩鼻中遂噦數聲及令驗之小便已自利余謂向來小便不利者因其年老氣弱不能降下也若端坐候小便自利不以法驗之豈不後時耶但血雖積聚日多若投仲景抵當湯丸慮藥勢太過血下之後尙有藥之餘力因而損壞臟腑變成血痢大爲後患愚因別立地黃湯主之連投之其血大下次日乃愈　元豐四年辛酉親戚孫氏妊娠第八月患傷寒至第五六日熱極第七日墮胎不及半日惡露遂絕至中夜臍下滿喜妄譫語至次日兩手脈沈細數膚冷小便自利此畜血證具也但病人年少血氣充盛又因產畜血深慮仲景抵當湯力薄別處生漆湯令服三次共服藥一升半其血乃下病遂愈今之醫者治畜血病依仲景方投抵當湯丸若病熱輕及病人年老氣弱其血大下之後病雖得愈往往下血不止何況太平之人五臟柔脆若不任蝱蟲水蛭之藥非仲景藥之過也乃醫者不審其時代又不量病人之強弱也若參酌其病能倣傚抵當湯丸方別立藥治之卽免病人後患矣今人纔見畜血將謂不可調治卽將抵當湯丸倍增而投之或連綿而投之畜血雖出而蝱蟲水蛭勢力未盡遂損壞腸胃日夕疠痛下血不止至于不救者十中八九矣醫者旣見病人下血云是臟毒尙不知自己投藥太過之罪也又盛衰論篇云診有十度形度脈度臟度肉度筋度俞度陰陽氣血人病自具注云診備盡陰陽虛盛之理則人病自知之又五常政大論篇云大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九無使過之傷其正也若醫者能參酌藥力量病投之乃爲良工矣

病人七八日以後。兩手脈沈遲細微。膚冷。臍下滿。或喜。或妄。或狂躁。大便實而色黑。小便自利者。此畜血證也。若年老及年少氣血虛弱者。宜地黃湯主之。

地黃湯

生地黃自然汁一升。或末二兩重。生藕自然汁。如無用小薊汁半升。如無用小薊末一兩。蝱蟲二十箇去足翅。炒黃。桃仁各半兩。藍葉一握。切令炒乾作末。水蛭十箇。炒乾。漆炒烟盡。大黃一兩。剉如骰子大。

右藥入水三升半。慢火熬及二升以來。放冷。分二服。投一服。至半日許。血未下。再投之。此比抵當湯丸力勢甚輕。如無地黃。與藕汁。計升數添水同煎。

病人七八日後。兩手脈沈細而數。或關前脈力大。臍下滿。或狂走。或喜妄。或譫語者。不大便。小便自利。若病人年少氣實。血凝難下。恐抵當湯丸力不能及之。宜生漆湯主之。

生漆湯

生地黃用汁一升。如無三兩半。大黃二兩剉。犀角半兩。桃仁三十箇。

右藥用水三升。好酒一升。慢火熬及三升以來。傾出濾去滓。再入鍋內。點生光漆一兩半。再熬至二升。即住火。淨濾去滓。分作三服。每投一服。候半日許。血未下。再投一服。候血下即止。後服如無生地黃汁。更添水一升同煎。

陰黃證篇

傷寒病發黃者古今皆爲陽證治之往往投大黃梔子蘗皮黃連茵陳之類亦未嘗得十全愚每于懷衡二郡間其病傷寒人有黃證風俗相傳多以新汲水浴之其病其愈者有不愈者又於邢磁二郡間病傷寒人有黃證風俗相傳以熱湯浴之或以湯漬布搭其胸腹或以湯盛瓢中坐在臍下熨之其病亦有愈者有不愈者其醫流莫能知其不愈之故見此二端愚深惑之且黃病既爲陽證何故以湯浴之既有得愈者豈不謂治黃病有證者乎嘗遍討諸醫書並無熱藥治黃病及無治陰黃法且仲景治傷寒論辨陽明病脈者傷寒發汗已身目爲黃所以然者寒濕在裏不解故也不可以下之於寒濕中求之仲景只云於寒濕中求之即不曾別立方藥後有傷寒類要治黃疸門中夫熱發黃已久變成桃花色心下有堅嘔逆不下飲食小便極赤少四肢逆冷脈深沈極微細遲者不宜服茵陳湯使下必變噦也宜與大茵陳湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息看脈小浮出形小見不甚沈微便可治也脈浮見者黃當明不復桃花色浮指下自覺也此類要中但只云脈浮大可治脈沈細不可治又於本卷治陰黃門中病源陰黃候陽氣伏陰氣盛熱毒加之故身面色黃頭疼而不發熱者名爲陰黃也論中雖稱陽伏陰盛即可服茵陳散方內卻用茵陳大黃梔子黃連紫雪之類亦皆寒藥卻與本病相違且陰黃者乃心病也心火爲濕所折即遍身發黃與傷寒黃病異矣傷寒病發黃本自脾弱水來凌犯又胃中空虛而變爲黃是與陰黃不同耳病人始於二三日務求汗下爲勝或服發汗溫中藥太過加以厚衣蓋覆仍於陰濕不通風處坐臥或以火劫之變爲黃病此乃陽黃也當投寒藥以治之藥證仲景論中悉具

病人三五日後。服下藥太過。虛其脾胃。亡津液。引水漿。脾土爲陰濕加之。又與暑相會。至第六七日變爲黃病。此乃陰黃也。當投湯藥治之。治法具在後說。

病人六七日。兩手脈沈遲細微。肢體逆冷。皮有粟起。時或嘔吐。舌上白胎。身發黃煩躁、欲於泥水中臥。小便赤少。醫者見病人黃生更不審察脈理。便投寒藥。其病愈甚。愚因而別撰成治陰黃病證幷方六七首。凡十餘年。不逢病陰黃者。自疑無憑。　元豐二年己未六月中。淦陽人趙宗顏病傷寒。至六七日發黃、來召、及到。診之。其脈沈細遲無力。皮膚涼發躁。欲於泥中臥、喘、嘔、小便澀。再三問病人曰。得非服下藥太過乎。病人曰然。才見此深喜之。此乃陰黃也。先投茵陳橘皮湯。不及劑。喘嘔止。次日投小茵陳湯半劑。脈微出。不欲於泥水中臥。次日又投茵陳附子湯半劑。四肢發熱。小便二三升。當日中大汗。　元豐五年壬戌五月中。淦陽趙埙秀才病傷寒。亦是醫者投下藥太早。及投解利涼藥過劑。至六七日。轉發黃病。至第七日來召。及到。診之。兩手寸脈不見。關尺脈沈遲細微。腹滿。小便澀。四肢遍身冷。面如桃花。一身盡黃。先投茵陳茯苓湯半劑。小便得利。次服茵陳四逆湯。脈出。四肢熱。目中黃先退。次日大汗。當年似此證者十餘人。不能一一寫錄。愚向日所思陰黃病。處方六首。初慮不能用。今既治數人。皆得中病。不可不傳焉。

傷寒病嘗校之。每遇太陰或太陽司天歲。若下之太過。往往變成陰黃。何故如是。蓋因辰戌歲。太陽寒水司天。寒化太過。卽水來犯土。丑未歲。太陰濕土司天。土氣不及。卽脾氣虛弱。又水來凌犯。多變斯證也。醫者宜審察之。

茵陳茯苓湯治病人五六日脈沈細微身温四肢冷小便不利煩躁而渴者

茯苓　桂枝各一兩　豬苓三分　滑石一兩半　茵陳蒿二兩

右爲末水四升煮取二升去滓放温分作四服如脈未出加當歸半兩

茵陳橘皮湯治病人脈沈細數身熱手足寒喘嘔煩躁不渴者

橘皮　生薑各一兩　半夏　茯苓各半兩　白朮一分　茵陳蒿一兩

右爲末水四升煮取二升去滓放温分爲四服

小茵陳湯治病人脈沈細遲四肢及遍身冷

附子一箇破作八片　甘草一兩　茵陳蒿二兩

右杵爲細末水二升煮取一升半去滓放温分作三服

茵陳四逆湯治病人脈沈細遲肢體逆冷腰以上自汗出

甘草　茵陳蒿二兩　乾薑一兩半　附子一箇破八片

右杵爲細末水四升煮取二升去滓放温分作四服

茵陳附子湯治病人服茵陳四逆湯身如冷汗出不止者

附子一箇破八片　乾薑一兩半　茵陳蒿一兩半

右爲細末水二大升煎取一升半去滓放温分作三服

茵陳茱萸湯治病人服附子湯證尚未退及脈浮者

吳茱萸　木通各一兩　乾薑　茵陳各一兩半　當歸三分　附子一箇破八片

右爲末水四升煎取二升去滓放温分作三服

勞復證篇

傷寒病大汗後餘熱未盡或飲酒或食肉或吃熱食太過與熱毒相逢使成勞復之患熱論篇云熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸道者熱甚而強食故有所遺若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣又岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也注云是所謂戒食勞也熱雖少愈猶未盡除脾胃氣虛未能消化內堅食駐故熱復生復謂復舊病也仲景傷寒論大病差後勞復者枳實梔子湯又傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之脈浮以汗解之脈沈實以下解之又大病差後喜唾久而不了了胸上有寒當丸藥温之宜理中丸

病人大病差後勞復者多是因熱所致卽再成傳汗之疾其間有胃中寒者只可與温中藥卽更不傳汗也温中藥者何用温中篇內七物理中丸温中湯可也

病人大病後勞復者纔二三日以後脈沈實若寸脈差大於關尺脈或寸關尺脈三部力停皆可下之況勞復病只有失下並無下之太早亦無下之太過何者蓋胃中有瘀熱在也更與熱飲食相合若下之晚

及下藥力少時。雖得汗。汗罷成勞復。至于三四發也。

病人二三日以後。服下藥畢。至第八九日未汗。纔見有證。即便宜下之。不可後時也。凡治勞復患。投下藥。不得與傷寒初受病人。一法治之也。

病人若因飲食所勞復傷。至第二三日。兩手脈沈實有力。或寸脈力大於關尺脈。或胸已上濈然汗出者。當急下之。宜大承氣湯。如一服下利未快。即再作調胃承氣湯服之。並用仲景方。

病人勞復。三四日以後。兩手脈沈數大有力。或發熱煩躁咽乾而渴。或面塵齒垢。或目中及遍身皆發黃者。宜丹砂丸主之。

丹砂丸

丹砂水飛過兩 馬牙硝各半兩 砂石一兩 麥門冬去心 犀角各三錢 金箔方寸許三十片 牛黃一錢

右合研勻。用濕紙裹爛粳米飯於湯火內燒。紙乾爲度。和前藥丸如彈子大。每服一丸。砂糖水化下。如黃甚者。煎茅根湯放冷。入砂糖一塊如棗大。同化下。如黃未退來日再服之。

病人用承氣湯下之後。至四五日。兩手脈沈數有力。或潮熱。或譫語者。更宜下之。或再投承氣湯。又胃中若不甚實。宜用丹砂散下之。

丹砂散

丹砂一粒 腻粉一錢 氣弱年老人減半

右合研勻。用桃柳心共一把許。細切研爛。紐取自然汁。入砂糖一塊如棗大。更入新汲水。通前成半盞。化前藥下之。如經一晝夜不利動。再作服之。此藥奇妙。不得與尋常下藥爲比也。如冬月無桃枝柳條。用生地黃一兩剉碎。水一升。煎取半升。化藥服。凡中諸藥毒者。用新銅錢一箇。口內含之。一二時辰許。如錢色黑。是中毒驗也。用丹砂一粒。臘粉一錢。砂糖一塊如棗大。同研勻。以藍葉取自然汁化下。日一服。重者不過三服。當下血如豚肝也。如無藍葉汁。只用藍葉末三錢匕。入在藥內。以東流河水同調下。凡小兒陽癇。潮搐涎盛。及角弓反張者。量大小。每用丹砂丸一粒。分作三服。只用砂糖水化下。如要利動。每服入臘粉。量少許同化下。此藥極有神效。今特錄示諸病於此者。恐醫流悞治傷寒汗下。畜血黃病及勞復也。



傷寒九十論

許叔微述

本館據琳琅祕室
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

四庫未收書

傷寒九十論提要

張金吾藏書志。

宋白沙許叔微知可述先列病證。後論治法。剖析頗精。是書諸家書目俱未著錄。伏讀欽定四庫全書總目云。叔微書屬辭簡雅。不諳於俗。故明以來。不甚傳布。是則因傳本稀少。故藏書家俱未之見歟。陳振孫曰。叔微有傷寒治法八十一篇。未知卽此書否。

傷寒九十論目錄

辯桂枝湯用芍藥證第一.
桂枝加厚朴杏子湯證第三.
大青龍湯證第五.
陽明蜜兌證第七.
臍中出血證第九.
傷寒暴死證第十一.
大柴胡湯證第十三.
傷寒自解證第十五.
筋惕肉瞤證第十七.
桂枝加葛根湯證第十九.
剛痓證第二十一.
太陰證第二十三.
指甲黑青證第二十五.
桂枝加附子湯證第二.
麻黃湯證第四.
陽明可下證第六.
腎虛陽脫證第八.
陰中伏陽證第十.
夜間不眠證第十二.
陽明急下證第十四.
熱入血室證第十六.
陽明當下證第十八.
葛根湯證第二十.
厥陰證第二十二.
太陽中暍證第二十四.
瞪目直視證第二十六.

舌卷囊縮證第二十七
邪入大經證第二十九
桂枝證第三十一
少陽證第三十三
三陽合病證第三十五
發熱惡寒證第三十七
結胷可灸證第三十九
漏風證第四十一
妊娠傷寒腳腫證第四十三
狐惑證第四十五
溼家發黃證第四十七
先汗後下證第四十九
陰病陽脈證第五十一
青筋牽引證第五十三
刺陽明證第五十五
循衣摸牀證第二十八
太陽桂枝證第三十（內併論桂枝麻黃青龍用藥三證）
少陰證第三十二
兩感證第三十四
白虎加人參湯證第三十六
結胷可下證第三十八
汗後吃逆證第四十
小便出血證第四十二
風溫證第四十四
發黃證第四十六
黃入清道證第四十八
太陽瘀血證第五十
辯少陰脈緊證第五十二
下膿血證第五十四
陰陽交證第五十六

陰陽易證第五十七.
傷寒耳聾證第五十九.
遺尿證第六十一.
衄血證第六十三.
傷寒温瘧證第六十五.
臟結證第六十七.
傷寒協熱利證第六十九.
霍亂轉筋證第七十一.
汗後勞復證第七十三.
面垢惡寒證第七十五.
傷寒閉目證第七十七.
手足逆冷證第七十九.
失汗衄血證第八十一.
格陽關陰證第八十三.
懊憹怫鬱證第八十五.
叉手冒心證第五十八.
揚手躑足證第六十.
舌上滑胎證第六十二.
傷寒脊痛證第六十四.
發班證第六十六.
陽結證第六十八.
胃熱嘔吐證第七十.
兩脛逆冷證第七十二.
汗後瘡瘍證第七十四.
傷寒下利證第七十六.
傷寒表實證第七十八.
寒熱類傷寒證第八十.
脾約證第八十二.
太陽陽明合病證第八十四.
兩手撮空證第八十六.

下利服承氣湯證第八十七。
血結胷證第八十九。
溼温證第八十八。
六陽俱絕證第九十。

傷寒九十論

宋　白沙許叔微知可述

辯桂枝湯用芍藥證一

馬亨道庚戌春病發熱頭疼鼻鳴惡心自汗惡風宛然桂枝證也時賊馬破儀眞三日矣市無芍藥自指圃園採芍藥以利劑一醫曰此赤芍藥耳安可用也予曰此正當用再啜而微汗解

論曰仲景桂枝加減法十有九證但云芍藥聖惠方皆稱赤芍藥孫尙藥方皆曰白芍藥聖惠方太宗朝翰林王懷隱編集孫兆爲國朝醫師不應如此背戾然赤者利白者補予嘗以此難名醫皆愕然失措謹案神農本草稱芍藥主邪氣腹痛利小便通順血脈利膀胱大小腸時行寒熱則全是赤芍藥也又桂枝第九證云微寒者去赤芍藥蓋懼芍藥之寒也惟芍藥甘草湯一證云白芍藥謂其兩脛拘急血寒也故用白芍藥以補非此時也素問云濇者陽氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒傷寒脈濇身熱無汗蓋邪中陰氣故陽有餘非麻黃不能發散中風脈滑多汗身寒蓋邪中陽故陰有餘非赤芍藥不能刮其陰邪然則桂枝用芍藥赤者明矣當參百證歌

桂枝加附子湯證二

有一李姓士人得太陽因汗後汗不止惡風小便澀足攣曲而不伸予診其脈浮而大浮爲風大爲虛此

證桂枝湯第七證也仲景云太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子三投而汗止再投以芍藥甘草而足得伸數日愈

論曰仲景第十六證云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯以攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其腳即伸若胃氣不和讝語者少與調胃承氣湯蓋第七證則爲發汗漏不止小便難第十六證則爲自汗小便數故仲景於證候紛紛小變異便變法以治之故於湯不可不謹

桂枝加厚朴杏子湯證三

戊申正月有一武弁在儀眞爲張遇所虜日夕置於舟艙板下不勝陘伏後數日得脫因飽食解衣捫蝨以自快次日遂作傷寒醫者以因飽食傷而下之一醫以解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高醫有愴惶罔知所指予診之曰太陽病下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏子湯此仲景法也醫者爭曰某平生不曾用桂枝況此藥熱安可愈喘予曰非汝所知也一投而喘定再投而濈濈汗出至晚身涼而脈已和矣醫者曰予不知仲景之法其神如此豈誑惑後世也哉人自寡學無以發明耳

麻黄湯證四

鄉人邱忠臣寓毗陵薦福寺病傷寒予爲診視其發熱頭疼煩渴脈雖浮數無力自尺以下不至予曰雖麻黄證而尺遲弱仲景云尺中遲者營氣不足血氣微小未可發汗予於建中湯加當歸黄芪令飲之翌

日病者不耐。其家曉夜督發汗藥。其言至不遜。予以鄉人隱忍之。但以建中調理而已。及六七日。尺脈方應。遂投以麻黃湯。啜第二服。狂言煩躁且悶。須臾稍定。已中汗矣。五日愈。

論曰。仲景雖云不避晨夜。卽宜便治。醫者亦須顧其表裏虛實。待其時日。若不循次第。雖暫時得安。虧損五臟。以促壽限。何足尙哉。昔范雲爲陳霸先屬。霸先有九錫之命。期在旦夕矣。雲偶感寒疾。恐不及豫盛事。請徐文伯診視之。懇曰。便可得愈乎。文伯曰。便差甚易。但恐二年後不復起爾。雲曰。朝聞道夕死可矣。況二年乎。文伯以火燒地。布桃柏葉。設席置其臥上。頃刻汗解。以溫粉撲之。翌日愈。甚喜。文伯曰。不足喜也。後二年果卒矣。夫取汗先期。而促壽限。況不顧表裏。不待時日。便欲速愈乎。每見病家不耐三四日晝夜促汗。醫者顧利。恐別更醫。隨情順意。鮮不致斃。故書此以爲龜鑒。

大靑龍湯證五。

何保義從王太尉軍中。得傷寒。脈浮濇而緊。予曰。若頭疼。發熱。惡風。無汗。則麻黃證也。煩躁。則靑龍湯證也。何曰。今煩躁甚。予投以大靑龍湯三投。汗解。

論曰。桂枝。麻黃。靑龍。皆表證發汗藥。而桂枝治汗出惡風。麻黃治無汗惡寒。靑龍治無汗而煩。三者皆欲微汗解。若汗多亡陽。爲虛。則煩躁不眠也。

陽明可下證六。

一武弁李姓。在宣化作警。傷寒五六日矣。鎭無醫。抵郡召予。予診視之曰。脈洪大而長。大便不通。身熱無

汗。此陽明證也。須下。病家曰。病者年踰七十。恐不可下。予曰。熱邪毒氣併畜於陽明。況陽明經絡多血少氣。不問老壯。當下。不爾別請醫占。主病者曰。審可下。一聽所治。予以大承氣湯半日。殊未知。診其病。察其證。宛然在。予曰。藥曾盡否。主者曰。恐氣弱不禁。但服其半耳。予曰。再作一服。親視飲之。不半時間。索溺器。先下燥糞十數枚。次溏洩一行。穢不可近。未離已中汗矣。濈然周身。一時頃。汗止身涼。諸苦遂除。次日予自鎮歸。病人索補劑。予曰。服大承氣湯得差。不宜服補劑。補則熱仍復。自此但食粥。旬日可也。故予治此疾。終身止大承氣一服而愈。未有若此之捷。

論曰。老壯者形氣也。寒熱者病邪也。臟有熱毒。雖衰年亦可下。藏有寒邪。雖壯年亦可溫。要之與病相當耳。失此。是致速斃也。謹之。

陽明蜜兌證七。

庚戌仲春。艾道先染傷寒。近旬日。熱而自汗。大便不通。小便如常。神昏多睡。診其脈長大而虛。予曰。陽明證也。乃兄景先曰。舍弟全似李大夫證。又屬陽明。莫可行承氣否。予曰。雖爲陽明。此證不可下。仲景陽明自汗。小便利者。爲津液內竭。雖堅不可攻。宜蜜兌導之。作三劑。三易之。先下燥糞。次洩溏。已而汗解。

論曰。二陽明證雖相似。然自汗小便利者。不可蕩滌五藏。爲無津液也。然則傷寒大證相似。脈與證稍異。通變爲要。仔細斟酌。正如以格局看命。雖年月日時皆同。貴賤窮通不相侔者。於一時之頃。又有淺深也。

腎虛陽脫證八。

朱保義撫辰庚戌春權監務予一日就務謁之見擁爐忍痛若不禁牀予問所苦小腸氣痛求予診之予曰六脈虛浮而緊非但小腸氣恐別生他疾越數日再往臥病已五日矣入其室見一市醫孫尙者供藥予診之曰此陰毒證腎虛陽脫脈無根蒂獨見於皮膚黃帝所謂懸絕仲景所謂譬如羹上肥也早晚喘急未幾而息已高矣孫生尙與朮附湯灸臍下予曰雖盧扁之妙無及矣是夕死故論傷寒以眞氣爲主

論曰傷寒不拘陰證陽證陰毒陽毒要之眞氣強壯者易治眞氣不守受邪纔重便有必死之道何也陽證宜下眞氣弱則下之便脫陰證宜温眞陰弱温之則客熱便生故醫者難於用藥非病不可治也主本無力也經曰陽勝則身熱腠理閉喘粗爲之俛仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿死陰勝則身寒寒則厥厥則腹滿死帝曰調此二者奈何岐伯曰女子二七天癸至七七止男子二八精氣溢八八止婦人月事以時下故七欲損也男子精欲滿不欲竭故八欲益也如此則男婦身常無病無病精氣常固雖有寒邪易於調治故曰二者可調是知傷寒眞氣壯者易治也

臍中出血證九

一婦人得傷寒數日咽乾煩渴脈弦細醫者汗之其始衄血繼而臍中出血醫者驚駭而遁予曰少陰強汗之所致也蓋少陰不當發汗仲景云少陰強發汗必動其血未知從何道而出或從口鼻或從耳目是爲下厥上竭此爲難治仲景云無治法無藥方予投以薑附湯數服血止後得微汗愈

論曰本少陰證而誤汗之故血妄行自臍中出若服以止血藥可見其標而不見其本予以治少陰之本

而用薑附湯。故血止而病除。

陰中伏陽證十。

鄉人李信道。權獄官。得病。六脈俱沈不見。深按至骨。則弦細有力。頭疼。身温。煩躁。手指末皆冷。中滿惡心。更兩醫矣。而醫者不曉。但供調藥。予往視之曰。此陰中伏陽也。仲景方無此證。而世人患者多。若用熱藥以助之。則陰邪隔絕。不能引導其陽。反生客熱。用寒藥。則所伏眞火愈見銷鑠。須是用破陰丹。行氣導水。奪眞火之藥。使火升水降。然後得汗而解。予令以冷鹽湯下破陰丹三百丸。作一服。不半時煩躁狂熱。手足漸温。譫語躁擾。其家甚驚。予曰。汗證也。須臾稍寧。略睡。濈然汗出。自昏達旦方止。身涼而病除。破陰丹方。硫黃水銀各一兩。結沙子青皮半兩。爲末。麪糊和丸桐子大。每服三十丸。冷鹽湯送下。出中藏經方脈擧要。

傷寒暴死證十一。

己未歲。一時官病傷寒。發熱狂言煩躁。無他惡證。四日死。或者以爲兩感。然其證初無兩感證候。是歲得此疾。三日四日死者甚多。人竊怪。予歎之曰。是運使然也。己爲土運。土運之歲。上見太陰。蓋太乙天符爲貴人。中執法者。其病速而危。中行令者。其病徐而持。中貴人者。其病暴而死。謂之異也。又曰。臣爲君則逆。逆則其病危。其害速。是年少宮土運。木氣大旺。邪中貴人。故多暴死。氣運當然。何足怪也。

夜間不眠證十二。

陳姓士人。初得病。身熱。脈浮。自汗。醫者麻黃湯汗之。發熱愈甚。夜間不得眠。頭重。煩悶。悸悸然。中風證強

責汗之過也。仲景云太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾燥。不得眠。其人欲得飲水者。少少與之。令胃氣和則愈。予先與豬苓湯。次投之以當歸地黃麥門冬芍藥烏梅之類爲湯。飲之。不汗而愈。

論曰黃帝鍼經曰。衞氣者晝行陽夜行陰。衞氣不得入於陰。常行於外。行於外則陽滿。滿則陽蹻盛而不得入於陰。陰虛則夜不得眠也。今津液內竭。胃中乾燥。獨惡於陽。陰無所歸。其候如此。故以當歸地黃補血。用烏梅以收之。故不汗自愈。

大柴胡湯證十三

羽流蔣尊病。其初心煩喜嘔。往來寒熱。醫初以小柴胡湯與之。不除。予診之曰。脈洪大而實。熱結在裏。小柴胡安能除也。仲景云傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡。二服而病除。

論曰大黃爲將軍。故蕩滌瀉熱。在傷寒爲要藥。今大柴胡湯不用。誠誤也。王叔和曰。若不加大黃。恐不名大柴胡。須是酒洗生用。乃有力。昔後周姚僧垣名善醫。上因發熱。欲服大黃。僧垣曰。大黃乃是快藥。至尊年高。不宜輕用。上弗從。服之。遂不起。及至元帝有疾。諸醫者爲至尊至貴。不可輕服。宜用平藥。僧垣曰。脈洪而實。必有宿食。不用大黃。病不能除。上從之。果下宿食而愈。此明合用與不合用之異也。

陽明急下證十四

鄉里豪子得傷寒。身熱。目痛。鼻乾。不眠。大便不通。尺寸俱大。已數日矣。自昨夕汗大出。予曰。速以大柴胡下之。衆醫駭然曰。陽明自汗。津液已竭。當用蜜兌。何故用大柴胡藥。予曰。此仲景不傳妙處。諸公安知之。

予力爭。竟用大柴胡兩服而愈。

論曰。仲景論陽明云。陽明病。多汗者。急下之。人多謂己自汗。若更下之。豈不表裏俱虛也。論少陰云。少陰病一二日。口乾燥者。急下之。人多謂病發於陰。得之日淺。但見乾燥。若更下之。豈不陰氣愈盛也。世人罕讀。予以爲不然。仲景稱急下之者。亦猶急當救表。急當救裏。凡稱急者。急不之。有三處纔覺汗出多。未至津液乾燥速下之。則爲徑捷。免致用蜜兌也。蓋用蜜兌已是失下。出於不得已耳。若胷中識得了了。何疑殆之有哉。

傷寒自解證十五。

閩人李宗古得疾。口中氣熱。脣乾。屈體臥。足冷。舌上有胎。予診之。尺寸俱緊。或者謂氣熱口乾。疑其陽勝。踡足臥。足冷。疑其陰勝。而又陰陽俱緊。是誠可疑也。若不熟讀仲景方法。何能治。予曰。尺寸俱緊。是寒邪勝也。仲景云陰陽俱緊。法當清。邪中於下焦。又云陰陽俱緊。口中氣出。脣乾舌燥。踡臥。足冷。鼻中涕出。舌上胎滑。勿妄治也。到七日以來。其人發熱。手足温者。此爲欲解。蓋已上證候。皆是陰盛陽弱。故仲景云勿妄治者。誠恐後人之疑也。故予以抑陰助陽温劑與之。緊脈漸退。四體和。不汗而自解矣。

熱入血室證十六。

辛亥二月。毗陵學官王仲景妹。始傷寒。七八日。晡寒。喉中涎響如鋸。目瞑不知人。病勢極矣。予診之。詢其未晡寒以前證。母在側曰。初病四五日。夜間譫語。如見鬼狀。予曰。得病之初。正值經候來否。答曰。經水方

來因身熱病作而自止予曰此熱入血室也仲景云婦人中風發熱經水適來晝日明了夜則譫語發作有時此爲熱入血室醫者不曉例以熱藥補之遂致胃腦不利三焦不通涎潮上脘喘急息高予曰病熱極矣先當化其涎後當除其熱無汗而自解矣予急以一呷散投之兩時間涎定得睡是日遂省人事自次日以小柴胡湯加生地黃三投熱除無汗而解

筋惕肉瞤證十七

鄉里市人姓京鬻繩爲業謂之京城子其子年近三十初得病身微汗脈弱惡風醫者誤以麻黃湯汗之汗遂不止發熱心痛多驚悸夜間不得眠臥譫語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫者以鎮心驚風藥治之予視之曰強汗之過也仲景云脈微弱汗出惡風者不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此爲逆也惟眞武湯可收之仲景云太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之予三投而大病除次以清心丸竹葉湯解餘毒數日差

陽明當下證十八

鄉人李生病傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒一醫以巴豆藥下之下之雖得溏利而病宛然如舊予視之曰陽明熱結在裏非大柴胡承氣不可巴豆止去寒積豈能蕩滌邪熱溫毒耶亟進大柴胡三服而溏利中夜汗解

論曰仲景一百十三方丸者有五理中陷胷抵當麻仁烏梅也理中陷胷抵當皆大彈丸煮化而服之與

湯散無異至於麻仁治脾約烏梅治溼蟨故須小丸達下部其他皆入經絡逐邪毒破堅癖導血潤燥屎之類必憑湯劑也未聞巴豆小丸以下邪毒且如巴豆性熱大毒而病熱人服之非徒無益而爲害不小矣李生慢服不死其大幸歟

桂枝加葛根湯證十九

庚戌建康徐南強得傷寒背強汗出惡風予曰桂枝加葛根湯證病家曰他醫用此方盡二劑而病如舊汗出愈加予曰得非仲景三方乎曰然予曰誤矣是方有麻黃服則愈見汗多林億謂止於桂枝加葛根湯也予令生而服之微汗而解

葛根湯證二十

市人楊姓者病傷寒無汗惡風項雖屈而強醫者以桂枝麻黃各半湯與之予曰非其治也是謂項強几几葛根證也三投濈濈然微汗解翌日項不強脈已和矣

論曰何謂几几如短羽鳥之狀雖屈而強也謝復古謂病人羸弱須憑几而起非是此與成氏解不同

剛痓證二十一

宣和戊戌表兄秦雲老病傷寒身熱足寒頸項痙瘈醫作中風治見其口噤故也予診其脈實而有力而又腳攣嚙齒大便不利身燥無汗予曰此剛痓也先以承氣湯下之次以續命湯調之愈矣

論曰五常政大論曰赫曦之紀上羽與正徵同其收齊其病痓蓋戊太陽寒水羽也戊火運正徵也太過

之火上見太陽則天氣且剛故其收齊而人病痙者過氣然耳火木遇故年病此證多剛痙

厥陰證二十二

里中一中表病渴甚飲水不止胃中熱痞氣衝心下八九日矣醫者或作中喝或作賁豚予診之曰證似厥陰曾吐蟲否曰昨曾吐蛔予曰審如是厥陰證也可喜者脈來沈而緩遲耳仲景云厥陰爲病消渴氣上撞心飢不欲食食則吐蛔又曰厥陰病渴欲飲水者少少與之愈今病人飲水過多乃以茯苓甘草白朮桂枝湯治之得止後投以烏梅丸數日愈

論曰病至厥陰若太陽傳者三陰三陽皆已遍惟恐脈強則肝邪盛脾土受剋故舌卷囊縮而死今脈來遲緩而沈則土脈得氣脾不受剋故有可喜之道仲景云衞氣和名曰緩營氣和名曰遲遲緩相搏名曰沈又曰寸口脈緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲商遲則陰氣盛骨髓滿精血生肌肉緊營衞俱行剛柔相濟豈非安脈耶

太陰證二十三

曹生初病傷寒六七日腹滿而吐食不下身温手足熱自利腹中痛嘔惡心醫者謂之陽多尙疑其手足熱恐熱畜於胃中而吐嘔或見吐利而爲霍亂請予診其脈細而沈質之曰太陰證也太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛予止以理中丸用仲景云如雞子黃大晝夜投五六枚繼以五積散數日愈

論曰予見世醫論傷寒。但稱陰證陽證。蓋仲景有三陰三陽。就一證中又有偏勝多寡。須是分明辯質。在何經絡。方與證候相應。用藥有準。且如太陰少陰。就陰證中自有補瀉。豈可止謂之陰證也哉。

太陽中喝證二十四。

毗陵一時官得病。身疼痛。發熱。體重。其胍虛弱。人多作風溼。或作熱病。則又疑其脈虛弱不敢汗也。已數日矣。予診視之。曰中喝證也。仲景云太陽中喝者。身熱體疼。而脈微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中所致也。予以瓜蒂散治之。一呷而愈。

論曰仲景論喝有三證。一則汗出惡寒。身熱而渴。此太陽經中喝也。一則發熱惡寒。身疼痛。其脈弦細芤遲。一則夏月傷冷水。水行皮中。身熱疼痛重而脈微弱。不可下。不可行溫鍼。上二證皆宜用白虎加人參湯。後一證。且用瓜蒂散方治。不見於本論。而見于金匱要略。其脈證云。治太陽中喝。身熱疼痛。而脈微弱者。夏月傷冷水。水行皮中所致。宜瓜蒂散。蓋謂此也。

指甲黑青證二十五。

乾明僧人。病傷寒。目赤。頗渴。咽乾。飲水無算。腰疼。身熱。脈沈而微細。此少陰證也。恣縱不愼忌。乃飲水。遂致痞氣。痞氣結聚。身如被杖。數日變爲陰毒矣。脈見於皮膚上。大而且虛。鼻中如煙煤。甲青。須臾發喘。是夕死。

論曰扁鵲云手足爪下青黑者死。宋迪陰證訣云。陰毒盛。則指甲黑青。病至此則爲不治。

瞪目直視證二十六。

田仲容得傷寒數日。身熱。手足時厥。腹滿。瞪目直視。狂言不識人。予診之曰不可治也。心腎俱絕矣。夜死。

論曰仲景云直視搖頭。此爲心絕也。又曰狂言反目直視。此爲腎絕也。目者五藏精華之所聚。今直視而不眴。則知五藏有死絕矣。故不治。

舌卷囊縮證二十七。

句容縣豪子李姓。初得傷寒。手足冷。氣上衝心。飢不欲食。脈緊而弦。予診曰厥陰悉具。脈有刑剋。最忌舌卷囊縮。翌日卷舌而死。

論曰內經云厥陰者肝也。肝者筋合之。筋者聚於陰器。絡於舌本。厥陰之氣。故舌卷而囊縮也。

循衣摸牀證二十八。

儀眞一婦。病傷寒八九日。發熱昏悶不識人。手循衣縫。摸牀譫語。不識人事。他醫不識。或汗或利。旬日增甚。予診之曰。此脈澀而小便不利。不可治也。翌日死。

論曰華陀云。病人循衣摸牀譫語。不可治。仲景云傷寒吐下後不解。不大便五六日。發潮熱不識人。循衣撮空。微喘直視。脈弦者生。脈澀者死。又云小便利者可治。今脈澀小便不利。見其兩死。不見一生。吾莫能爲也。

邪入大經證二十九。

維揚謝康中任儀眞酒官。咽乾煩渴。腰疼。身熱。脈細而微急。予診視之。曰此眞少陰證也。六經之中。少陰難治。少陰病傳之經絡。此證有補瀉法。仲景瀉者用承氣。補者用四逆。誤之則相去遠矣。此證當温。勿以水證爲疑也。予適以事出境。後七日歸。則爲他醫汗之矣。經絡既虛。邪毒流入大經之中。手足瘈瘲。如驚癎狀。其家狠狽求救。予曰不可治也。予驗此甚多。是謂邪入大經。不旋踵。其家已哭矣。

太陽桂枝證三十

鄉人吳德甫得傷寒。身熱。自汗。惡風。鼻出涕。關以上浮。關以下弱。予曰此桂枝證也。仲景法中第一方。而世人不究耳。但公服之。一啜而微汗解。翌日諸苦頓除。公曰仲景法如此徑捷。世人何以不用。予應之曰仲景論表證。一則桂枝。二則麻黄。三則青龍。桂枝則治中風。麻黄治傷寒。青龍治中風見寒脈。傷寒見風脈。此三者人皆能言之。而不知用藥對證之妙處。故今之醫者多不喜用。無足怪也。且脈浮而緩。中風也。故發熱惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。仲景以桂枝對之。脈浮緊而澀。傷寒也。故頭痛發熱。身疼腰痛。骨節皆疼。惡風無汗而喘。仲景以麻黄對之。至於中風脈緊。傷寒脈浮緩。仲景皆以青龍對之。何也。予嘗深究三者。審於證候。脈息相對。用之無不應手而愈。何以言之。風傷衞。衞氣也。寒傷營。營血也。營行脈中。衞行脈外。風傷衞則風邪中於陽氣。陽氣不固。發越而爲汗。是以汗出而表虛。故仲景用桂枝以發汗。芍藥以利其血。蓋中風病在脈之外。其病稍輕。雖同曰發汗。特解肌之藥耳。故桂枝證云。令遍身漐漐微似有汗者。益佳。不可如水淋漓。病必不除。是知中風不可大發其汗。發其汗反動營血。邪乘虛而居中。故病不除也。

寒傷營。則寒邪干於陰血。而營行脈中者也。寒邪客於脈中。非特營受病也。邪自內作。則併於衞氣犯之。久則浸淫及骨。是以汗不出而熱煩寃。仲景以麻黃大發其汗。又以桂枝辛甘助其發散。欲捐其內外之邪。營衞之病耳。大抵二藥皆發汗。而桂枝則發衞之邪。麻黃併衞與營而治之。仲景桂枝第十九證云。病常自汗出者。此爲營氣和。營氣和者外不諧。以衞氣不共營氣和諧故耳。營行脈中。衞行脈外。復發其汗。營衞和。則愈。宜桂枝湯。又第四十七證云。發熱汗出者。此謂營弱衞強。故使汗出。欲救風邪。宜桂枝湯。是知中風汗出者。營和而衞不和也。又第一卷云。寸口脈浮而緊。浮則爲風。緊則爲寒。風則傷衞。寒則傷營。營衞俱病也。麻黃湯中。併桂枝而用。此仲景之意歟。至於青龍。雖治傷寒見風脈。傷風見寒脈。然仲景云汗出惡風。不可服之。服之則厥逆筋惕肉瞤。故青龍一證尤難用。須是形證的當。然後可行。王宬大夫證治中。止用桂枝麻黃各半湯代之。蓋愼之也夫。

桂枝證三十一。

里間張太醫家一婦。病傷寒。發熱惡風。自汗。脈浮而弱。予曰。當服桂枝。彼云家有自合者。予令三啜之。而病不除。予詢其藥中用肉桂耳。予曰。肉桂與桂枝不同。予自治以桂枝湯一啜而解。

論曰。仲景論用桂枝者。蓋取桂枝輕薄者耳。非肉桂之肉厚也。蓋肉桂厚實。治五藏。用之。取其鎮重。桂枝清輕。治傷寒用之。取其發散。今人一例是以無功。

少陰證三十二。

有人病傷寒數日自汗。咽喉腫痛。上吐下利。醫作伏氣。予診之曰。此證可疑。似是之非。乃少陰也。其脈三部俱緊。安得謂之伏氣。伏氣脈必浮弱。謂非時寒冷。着人肌膚。咽喉先痛。次下利者是也。近雖有寒冷不時。然當以脈證爲主。若誤用藥。其斃可待。予先以吳茱萸湯救之。次調之以諸藥而愈。

論曰仲景論伏氣之病。其脈微弱。喉中痛。似傷寒非喉痺也。實咽中痛。今復下利。仲景少陰云。病人手足俱緊。反汗出者亡陽也。此屬少陰證。法當咽痛而復吐利。此證見少陰篇。今人三部脈俱緊。而又自汗。咽痛下利。與伏氣異。然毫釐之差。千里之謬。須講熟此書。精詳分別。庶免疑惑矣。

少陽證三十三。

市人周姓者。同里俱病頭痛發熱。耳聾目赤。胷中滿悶。醫中見外證胷滿。遂吐之。既吐後病宛然在。又見其目赤發熱。復利之。病不除。惴惴然恂慄。予診視之曰。少陽誤吐下之過也。仲景少陽中風。兩耳無聞。目赤。胸滿而煩者。不可吐下。吐下則驚而悸。此當用小柴胡湯。今誤吐下。遂成懷證矣。乃以牡蠣四逆湯調於前。繼之以桂枝柴胡各半湯。旬日瘥。

論曰仲景雖云三陽受病。未入於藏者。可汗。然少陽脈弦細。則不可汗。將入少陰經也。若誤吐下之。是逆之。且當以救逆。先待驚悸定後治餘證。此所謂急其所當先也。

兩感證三十四。

族弟初得病。頭痛口乾煩渴。第三日。予往視之。則已耳聾囊縮。昏冒不知人。厥逆。水漿不下矣。予曰速治

後事是謂兩感證不可治矣越三日死

論曰仲景論傷寒兩感云凡傷於寒熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死又曰兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同既云必死又云治有先後何也大抵此病表裏雙傳藏腑俱病患此者十無一生故云必死然仲景豈以已見而重誣後人哉故有發表攻裏之說以勉後人恐萬世後遇大聖而得之不欲絕望於後人仲景之心仁矣

三陽合病證三十五

有市人李九妻患腹痛身體重不能轉側小便遺失或作中溼治予曰非是也三陽合病證仲景云見陽明篇第十證三陽合病腹滿身重難轉側口不仁面垢譫語遺屎不可汗汗則譫語下則額上汗出手足逆冷乃三投白虎湯而愈

白虎加人參湯證三十六

從軍王武經病始嘔吐俄爲醫者下之已八九日而內外發熱予診之曰當行白虎加人參湯或云既吐復下是裏虛矣白虎可行乎予曰仲景云見太陽篇二十八證若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯證相當也蓋吐者爲其熱在胃脘而脈致令虛大三投而愈

論曰仲景稱傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者人參白虎湯主之又云傷寒脈浮無汗發熱不解不可與白虎湯又云脈滑爲表有熱裏有寒白虎湯主之國朝林億校正謂仲景此法必表裏

字差矣。是大不然。大抵白虎能除傷寒中暍。表裏發熱。故前後證或云表裏俱熱。或云表熱裏寒。皆可服之。宜也。中一證稱表不解不可服者。以其宜汗發熱。此全是傷寒麻黃與葛根湯證。安可行白虎。林但見所稱表裏不同。便謂之差。是亦不思不精之過也。

發熱惡寒證三十七。

人患發熱惡寒自汗。脈浮而微弱。予以三服桂枝投之。遂愈。仲景云太陽中風。陽浮而陰弱者。汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。宜桂枝湯。

論曰仲景云假令寸口脈微名曰陽不足。陰氣上入陽中。則灑淅惡寒也。尺脈弱名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱。此醫發其汗。使陽氣微。又大下之。使陰氣弱。此謂醫所病而然也。大抵陰不足陽從之。故陽由陷發熱。陽不足陰往乘之。故陰上入陽中。則惡寒。陰陽不歸其分。是以發熱惡寒也。故孫眞人云有熱不可大攻之。熱去則寒起。

結胷可下證三十八。

維揚李寅始病頭疼。發熱惡風。醫者下之。忽爾心下堅硬。項強。短氣宛然。結胷中證也。予曰幸爾脈不浮。心不煩躁。非陷胷湯不可投之。一宿乃下。

論曰仲景言病發於陽而反下之。熱入於胷。因作結胷者。以下之太早故也。蓋惡寒尚有表證未罷。而下之。故陽氣內陷。陽內拒痛。脈浮者不可下。下之則死。結胷煩躁者必死。此是惡證。辯者仔細。

結胷可灸證三十九

城東李氏子年十八病傷寒結胷狀如痓自心至臍手不可近短氣心煩眞結胸也醫者便欲下之予適過其門見其愴惶面無色予曰公有憂色何也曰以長子病傷寒作結胷證醫者將下之而猶豫予就爲診之自關以上浮大表證未罷不可下也曰事急矣予以黃連餅子灸臍中數十壯得氣下心腹軟繼以和氣解肌藥數日瘥當時若下定是醫殺

汗後吃逆證四十

張保義得汗後吃逆或者以胃虛則噦故吃逆也投以乾薑橘皮等湯不下命予治之予曰此證不可全作胃虛治六脈尚躁是餘毒未解耳投以小柴胡湯兩啜而愈

漏風證四十一

癸卯秋九月牒試淮南僧臺同試有建陽彭子靜得疾身熱頭痛嘔逆自汗如洗已數日矣召予診視謂予曰去試不數日而疾勢如此爲之奈何予曰誤服藥多矣此證當先止汗幸無憂也予作朮附湯與之三投而汗止次日微汗瘥瘥身涼五日而得愈

小便出血證四十二

里人有病中脘吐心下煩悶多昏睡倦臥手足冷蓋少陰證也十餘日不瘥忽爾通身大熱小便出血予曰陰虛者陽必湊之今脈細弱而臍下不痛未可下桃仁承氣且以芍藥地黃湯三投而愈

妊娠傷寒腳腫證四十三。

里巷一婦人妊娠。得傷寒。自腰以下腫滿。醫者或謂之阻。或謂之腳氣。或謂之水分。予曰此證受胎脈也。病名曰心實。當利小便。醫者曰利小便。是作水分治。莫用木通葶藶桑皮否。曰當刺勞宮關元穴。醫大駭曰。此出何家書。予曰仲景玉函經曰。婦人傷寒。妊娠。及七月。腹滿。腰以下如水溢之狀。七月太陽當養不養。此心實。當刺勞宮及關元。以利小便。則愈。予教令刺穴。遂瘥。

風温證四十四。

己酉虜騎破淮俱疫癘大作。時有王朝奉寓天慶。得疾。身熱自汗。體重難以轉側。多眠。鼾睡。醫作三陽合病。或作漏風證。治之不愈。予曰此風温病。投以萎蕤湯。獨活湯。數日瘥。

論曰仲景云見太陽病脈篇。太陽病。發熱而渴。不惡寒者爲温病。若發汗已。身灼熱者。名曰風温。風温爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癎。時瘛瘲。又云陽脈浮滑。陰脈濡弱。更遇於風。變爲風温。大抵温氣大行。更遇風邪。則有是證。令當春夏。病此者多。醫作傷寒漏風治。非也。不是火不可下。不可大發汗。而仲景無藥方。古法謂可取手少陰火。足厥陰木。隨經所在而取之。故用萎蕤湯。獨活湯。輩爲宜。若發熱無下證者。當用知母石膏湯。誤汗之。則防己黃芪湯救之。

狐惑證四十五。

句容縣東豪子李姓者。得傷寒數日。村落無醫。易師巫者五六日矣。或汗下。雜治百出。遂成壞病。予時自江北避寇。遁伏江左。求宿於其家。夜半聞呻吟聲。詢之。云患傷寒。逾旬矣。予爲診視。其脈見於上下脣。皆已蠹蝕。聲嘶而咽乾。舌上白胎。齒無色。予曰。病名狐惑。殺人甚急。秉燭爲作雄黃丸瀉心湯。投之。數日瘥。

發黃證四十六。

五月。避地維揚東面里沙中。一豪子病傷寒八九日。身體洞黃。鼻目皆痛。兩脾及項頭腰皆強急。大便澀。小便如金。予診曰脈緊且數。其病脾先受溼。暑熱蘊蓄於足太陰之經。宿穀相搏。鬱蒸而不得泄。故使頭面有汗。項以下無之。若鼻中氣冷。寸口近掌無脈。則死。今脈與證相應。以茵陳湯調五苓散與之。數日瘥。

溼家發黃證四十七。

人病身體疼痛。面黃喘滿。頭痛。自能飲食。大小便如常。或者多以茵陳五苓散與之。予診其脈曰。大而虛。鼻塞且煩。其證如前。則非溼熱與宿穀相搏。乃頭中寒溼。仲景云疼痛發熱。面黃而喘。頭痛。鼻塞而煩。其脈大。自能飲食。腹中和。無病。病在頭中寒溼。故鼻塞。納藥鼻中則愈。而仲景無藥方。其方見水壹。刪繁證云。治天行熱毒。通貫臟腑。沈鼓骨髓之間。或爲黃疸。須瓜蒂散。瓜蒂二七枚。赤小豆秫米各二七枚。爲末。如大豆許。內鼻中。縮鼻。當出黃水。愼不可吹入鼻中深處。（文煒按水壹二字疑有誤。）

黃入清道證四十八。

夏有高師病黃證。鼻內瘡疼。身與目如金色。小便赤澀。大便如常。則知病不在臟腑。今眼睛疼。鼻額痛。則

知病在清道中矣。清道者華蓋。肺之經也。若服大黃則必腹脹爲逆。當用瓜蒂散。先含水。次搐之。令鼻中黃水盡則愈。如其言。數日而病除。

先汗後下證四十九。

己酉夏。一時官病傷寒。身熱頭疼。無汗。大便不通。已五日矣。予適自外邑歸城。訪之。見醫者治大黃芒硝輩。將下之矣。予曰。子姑少待。予適爲診視。視之脈緩而浮。臥密室中。自稱惡風。予曰。病人表證如此。雖大便閉。腹且不滿。別無所苦。何遽便下。於仲景法。須表證罷。方可下。不爾。邪毒乘虛而入內。不爲結胸。必爲協熱利也。予作桂枝麻黃各半湯。繼之以小柴胡湯。漐漐然汗出。大便通。數日愈。

論曰。仲景云。傷寒病多從風寒得之。始表中風寒入裏。則不消矣。擬欲攻之。當先解表。方可下之。若表已解而內不消。大滿大堅。實有燥屎。方可議下。若不宜下而遽攻之。諸變不可勝數。輕者必篤。重者必死。

太陽瘀血證五十。

仇景莫子儀病傷寒七八日。脈微而沈。身黃發狂。小腹脹滿。臍下如冰。小便反利。醫見發狂。以爲熱毒蓄伏心經。以鐵粉牛黃等藥。欲止其狂躁。予診之曰。非其治也。此瘀血證爾。仲景云。陽病身黃。脈沈結。小腹硬。小便不利。爲無血。小便自利。其人如狂者。血證也。可用抵當湯再投。而下血幾數升。狂止。得汗而解。經云。血在下則狂。在上則忘。太陽膀胱經也。隨經而蓄于膀胱。故臍下脹。自闌門會滲入大腸。若大便黑者。此其驗也。

陰病陽脈證五十一

劉中道初得病。四肢逆冷。臍中築痛。身疼如被杖。蓋陰證也。急投金液來復之類。其脈得沈而滑。蓋沈者陰證也。滑者陽脈也。病雖陰而是陽脈。仲景所謂陰證見陽脈生也。於是再灸臍下丹田百壯。謂手足溫。陽回體熱而汗解。

或問滑脈之狀如何。曰仲景云翕奄沈名曰滑。古人論滑脈。雖云往來前卻。流利展轉。替替然與數相似。曾未若仲景三語而足也。翕合也。言張而復合也。故云翕爲正陽。沈言脈降而下也。故曰沈爲純陰。方翕而合。俄降而下。奄謂奄忽之間復降也。仲景論滑脈。方謂諦當也。

辯少陰脈緊證五十二

玄華得傷寒六七日。煩昏睡多吐嘔。小便白色。自汗出。予診其脈。寸口尺中俱緊。謂曰寒中少陰經中。是以脈緊。當作少陰治也。仲景云病人脈緊反汗出亡陽也。屬少陰證。當咽痛而復吐利。蓋謂此也。

有難者曰。脈訣以緊爲七表。仲景以緊爲少陰。緊脈爲陰耶。予曰寸口脈俱緊者。口中氣出。脣口乾燥。踡臥足冷。鼻中涕出。舌上白胎。勿妄治也。又云緊則爲寒。又云曾爲人所難。緊脈從何而來。師曰。假令亡汗若吐。以肺裏寒。故令脈緊。又曰寸口脈微。尺中緊。其人虛損多汗。由是觀之。則是寒邪入經絡所致。皆虛寒之脈也。其在陽經則浮而緊。在陰經則沈而緊。故仲景云浮緊者名爲傷寒。又云陽明脈浮而緊者。必潮溼。此在陽則脈浮而緊者。仲景又云病人脈陰陽俱緊者。屬少陰。又云寸口脈微。尺脈緊。其人虛損多

汗。則陰常在絕不見陽。又云少陰。脈緊至七八日。自下利。脈暴微。手足反温。脈緊反去者。此欲解也。此在陰沈而緊也。仲景云浮爲在表。沈爲在裏。數爲在腑。遲爲在臟。欲知表裏臟腑。先以浮沈遲數爲定。然後兼餘脈而定陽陰也。若於脈訣而言。則疏矣。故予嘗謂傷寒脈者。當以仲景脈爲準法。

青筋牽引證五十三

吳德甫戊申春病傷寒。先寒後熱。項筋強急。腳踡縮不得伸。醫者欲以麻黃羗除其頸強。又欲桂枝加附除其足縮。予曰皆非治也。此時行疫氣病。爲青筋牽引。投以柴胡地黃湯三服而病已。

論曰。廬安常論四時受乖氣。而成臟腑陰陽溼毒者。春名青筋牽。夏曰赤脈攢。秋名白氣貍。冬名黑骨温毒。四季中十八日名黃肉。隨毒氣在頭項。使人青筋牽急。故先寒後熱。腳縮不得伸。蓋謂此。夫天行之病。大則流毒天下。小則方次一鄉。亦有遍着一家者。悉由氣運鬱結。變成乖戾之氣。人命遭之所成病者。能調護將理。庶可免耳。

下膿血證五十四

遠族人患傷寒。他醫以陰證治之。硫黃附子相繼而進。旬日大脹下膿血。或如赤豆汁。醫尙作少陰證治。復下桃花湯治之。予因診視曰。所誤多矣。表裏虛。熱氣乘虛入腸胃。而又投以燥藥。是以下膿血也。遂投梅煎散數劑愈。

刺陽明證五十五

庚戌五月李氏病傷寒身熱頭痛無汗渾身疼痛脈浮大而緊予投以麻黃湯數服終不得汗又多用張苗燒蒸之法而亦不得予教令刺陽明少間汗出漿漿遍身一時間是夕身涼病退

論曰刺熱論云熱病先手臂痛刺陽明而汗出又曰刺陽出血如大豆病已蓋謂刺也陽明穴在手大指內側去爪甲角手陽明脈之所出也刺可入同身寸之一分留一呼大凡傷寒熱病有難取汗者莫如鍼之爲妙仲景云凡治溫病可刺五十九穴素問云病甚者爲五十九刺其詳在註中

陰陽交證五十六

里有張姓者病傷寒醫汗之汗雖出身熱如舊予診之曰得汗宜身涼脈靜喜食今脈躁身熱不食狂言病名陰陽交不可治也素問黃帝問有溫病汗出輒復熱而脈躁病不爲汗衰狂言不能食名何疾岐伯曰病名陰陽交交者死也人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪卻而精勝也精勝則能食而不復熱矣汗者精氣今汗出而復熱者是邪勝也不能食者精無俾也其壽可立而傾也果半日死

陰陽易證五十七

己巳鄰人王友生以販京爲業畜一婢患傷寒熱八九日予爲治之得汗而愈未數日生自病身熱頭重不欲舉目中生花召予視之予曰是必傷寒初愈婦人交接得之即今陰頭上必腫小腹絞痛然是陰陽易也生曰前患者婢子意謂已安遂與之交翌日得此疾良苦予曰失所治必吐舌數寸而死予作鼠

糞燒禪散等以利其毒氣旬日安

叉手冒心證五十八

乙巳六月吉水譚商人寓城南得傷寒八九日心下惕惕然以兩手捫心身體振振動搖他醫以心痛治之不效予曰此汗過多之所致也仲景云持脈時病人叉手自冒心心下悸所以然者以重獲汗虛故如此又云發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯證予投黃芪建中眞武及甘草桂枝漸得平復

傷寒耳聾證五十九

戊申年類試山陽一時官病傷寒八九日耳聾而無聞楚醫少陽治意謂仲景稱少陽受病則脅痛而耳聾也予診之曰兩手脈弱而無力非少陽證也若少陽則渴飲水心煩但寐咽痛今俱無此證但多汗驚悸必汗過多所致也仲景云未持脈時令病人欬而不欬者兩耳聾無所聞也所以然者因重發汗虛故如此病家曰醫者嘗大發汗矣遂投以眞武白朮附子湯輩數日耳有聞而愈

揚手躑足證六十

己酉王仲賢患傷寒發熱頭痛不惡風身無汗煩悶脈浮而緊八九日不退予診之曰麻黃證也所感多熱是以煩躁遂投以麻黃湯三服至暮煩愈甚手足躁亂揚躑不止或以爲發狂須用寒藥予爭之曰此汗證也幸勿憂切忌亂服藥守一時須稍定比寐少時中汗出矣仲景云至六七日三部大手足躁亂者

欲解也。蓋謂此耳。若行寒劑。定是醫殺。

遺尿證六十一。

城南婦人。腹滿身重。遺尿。言語失常。他醫曰不可治也。腎絕矣。其家驚憂無措。密召予至。則醫尚在座。乃診之曰。何謂腎絕。醫家曰仲景謂溲便遺失。狂言。反目直視。此謂腎絕也。予曰今脈浮大而長。此三陽合病也。胡爲腎絕。仲景云腹滿身重。難以轉側。口不仁。譫語。遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗。手足厥冷。白虎證也。今病人譫語者。以不當汗而汗之。非狂言反目直視。須是腎絕脈方可言此證。乃投以白虎加人參湯。數服而病悉除。

舌上滑胎證六十二。

丁未五月。鄉人邢原暉病傷寒。寒熱往來。心下鬱悶。舌上白滑胎。予曰舌上滑胎有數證。有陰陽脈緊。鼻出涕者。有藏結而不可治者。有溫瘴。丹田有熱者。有陽明脅下堅者。此證屬陽明。宜梔子湯吐之於前。小柴胡繼於其後。數日汗解而愈。

衄血證六十三。

睢陽張士美病傷寒七八日。口燥飲水而不嚥入。俄而衄血。脈浮緊。身熱。醫者云傷寒。脈浮緊。不發汗。因致衄血者。屬麻黃湯。予曰不可。古人雖云當汗不汗。熱化爲血。此證亦有不可汗者。仲景云陽明病。口燥。但欲飲水而不嚥者。必發衄。衄家不可發汗。發汗則額上陷。不得眠。不能眴。此只可用犀角湯地黃湯。若

當時行麻黃必須上陷直視不眠也。

傷寒脅痛證六十四。

董齊賢病傷寒數日兩脅挾臍痛不可忍或作奔豚治予視之曰非也少陽膽經循脅入耳邪在此經故病心煩喜嘔渴往來寒熱默不能食胷脅滿悶少陽證也始太陽傳入此經故有是證仲景云太陽病不解傳入少陽脅下滿乾嘔者小柴胡湯主之三投而痛止續得汗解。

傷寒溫瘧證六十五。

友人孔彥輔病傷寒身大熱頭痛自汗惡熱陽明證也此公不愼將理病未除當風取涼以自快越半月寒熱大交作予再視之則爲壞病溫瘧矣仲景云若十三日以上更感異氣變爲他病者當依舊壞病證而治之若脈陰陽俱盛重感於寒變成溫瘧脈之變證方治如法乃小柴胡湯之類加桂枝治之愈。

論曰往來嘗見一士人施瘧方以榜睢陽市肆柴胡白虎之類也俗人不問是何瘧證例用前方往往反變大疾嗚呼將欲濟人反致損人豈理也哉予嘗謂瘧證最多有暑瘧食瘧脾寒瘧手足三陰三陽皆有瘧脾肺腎肝心胃亦有瘧各各不同安得一概與柴胡白虎湯耶誤治尙可擬議惟脾寒中暑二證若水火不相將素問曰夏傷於暑秋爲痎瘧又曰夏暑汗不出者秋成風瘧始因伏暑得秋氣乃發故先熱後寒或熱多寒少頭目昏痛虛則發戰汗出一時而止蓋心惡暑氣心爲君心不受邪而心包絡痰涎所聚暑伏於涎中豈比脾寒而厚朴草果所能驅溫瘧而柴胡黃芩所能止也非砒硃腦麝之屬不能入故暑

瘧脾寒患者多。而醫者不識。妄投以寒藥。眞氣先受病。所以連綿不已也。予嘗精究瘧證一病。須詳審諦當。然後行藥。十治十中。無有失者。衆人以瘧爲難療。予獨以爲易治。要在別其證類。識其先後耳。因論温瘧。言及此。亦欲使患者知藥不可妄投也。素問瘧論甚詳。當精觀之。

發斑證六十六。

族有乳媼。患傷寒七八日發斑。肌體如火。脈洪數而牢。心中煩滿不快。俄而變赤黑斑。其家甚驚惶。予曰。此温毒也。温毒爲病最重。而年齒爲邁。是誠可憂也。仲景云傷寒脈洪數。陰脈實大。更遇溼熱。變成温毒。温毒最重也。故斑疹生。心下不快。痞悶。遂以升麻玄參湯與之。日夜四五服。斑退而愈。

論曰。華陀云傷寒五日在腹。六日在胃。入胃則可下也。若熱毒未入於胃。而先下之者。其熱乘虛入胃。則胃爛。然熱入胃。要須復下之。不得留在胃中也。胃若實。爲致此病。三死一生。其熱微者。亦斑出。劇者黑斑出。亦斑出者五死一生。黑斑出者十死一生。但看人有強弱耳。病者至日。不以時下之。熱不得泄。亦胃爛斑出。蓋此是惡候。若下之早。則熱乘虛入胃。或下遲。則熱入不得泄。須是乘機不可失時。庶幾輕可也。

臟結證六十七。

甲辰。鹽商艤舟江次。得傷寒。胷膈痞。連臍下旁不可忍。飲食不進。予診之曰。此非結胷。乃臟結也。不可救矣。臟結者。寸脈浮。關脈細小沉緊者。尙有白胎。痛引小腹則死。仲景云痛引小腹。入陰經者死。次日痛引小腹。午時果死。

陽結證六十八。

豫章劉商人傷寒發熱。口苦咽乾。腹滿。能食。大便閉。醫作陽明治。召予視。同坐。予問醫曰。何以見證屬陽明。醫曰仲景云陽明中風。口苦咽乾腹滿。又云陽明病若能食名曰中風。不能食名曰傷寒。又曰少陽陽明者胃中煩。大便難。是審茲三者。全是陽明證也。予曰陽明之脈長而實。中風者必自汗。今證雖陽明。然脈反見數。而身無汗。果可作陽明治否。醫無以應。予曰以僕觀之。所謂陽結也。今計其日已十六日矣。來日當病劇。當與公治之。其家疑而不決。來日病果大作。亟召。予曰是陽結證也。仲景云脈有陰結陽結。何以別之。答曰其脈浮而數。能食不大便。此爲實。名陽結也。其脈沉而遲。不能食。身體重。大便反鞕。名曰陰結。期十四日當劇。今病者十七日而劇者。是其候也。乃投以大柴胡兩啜而病除矣。

論曰仲景云脈來纍纍如車蓋者。名曰陽結。脈來累累如循長竿者。名曰陰結。纍纍如車蓋。則是浮是數之狀。仲景所謂善取象矣。然則陽結何以十七日當劇。陰結何以十四日當劇。蓋十七日老陽少陽之數。十四日老陰少陰之數也。老陽之數九。少陽之數七。七九計十六。更進一數。陽之數而其道常饒。又陽數奇。故也。老陰之數六。少陰之數八。八六計十四日。不進者。陰主靜。而其道常乏。又陰數偶也。如此盈虛消長。不能逃乎時數。

傷寒協熱利證六十九。

庚戌四月。鄉婦吳氏病傷寒。頭疼身熱。下利不止。衆醫多以附子理中金液治之。煩躁而利愈甚。予視之

曰脈遲而沉若臍下熱則協熱利也投三黃熟艾湯三服而利止渴除漸投以解肌汗藥而得汗瘥

胃熱嘔吐證七十

丁未歲夏族妹因傷寒已汗後嘔吐不止強藥不下醫以丁香硝石硫黃藿香等藥治之蓋作胃冷治也予往視之曰此汗後餘熱尚留胃腕若投以熱藥如以火濟火安能止也故以香薷湯竹茹湯三服愈

霍亂轉筋證七十一

夏鍾離德全一夕病上吐下瀉身冷汗出如洗心煩躁予以香薷飲與服之翌日遂定進理中等調之痊論曰仲景云病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止而復作更發熱也此病多由暑熱陰陽不和清濁相干飲食過傷三焦溷亂腹中撮痛煩渴不止兩足轉筋殺人頗急不可緩也

兩脛逆冷證七十二

江西茶客吳某病頭疼如裹兩腳自膝以下皆冷胷間多汗時時譫語醫作陰證治以附子薑意其足冷而厥也予診其脈關濡尺急遂斷以溼温脈證其病先日受溼而又中暍溼熱相搏故此證成急以白虎三投而解

汗後勞復證七十三

有人傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數宛然復作斷之曰勞心所致也神之所舍未復其初而又勞傷

其神營衞失度當補其子益其脾解其勞庶幾便愈醫者在座難之曰虛則補其母今補其子出在何經也予曰出千金方論子不知虛勞之證乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛則當補其母也千金方心勞甚者補脾氣以益其心脾旺則感於心矣此勞則補其子也蓋母生我者也子繼我助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子未有子富而父貧同義故二者補法各自有理醫唯唯而退

汗後瘡瘍證七十四

李琛大夫病傷寒發熱面目俱赤氣上衝服滿大小便閉無汗脈緊而長予令服大承氣湯他醫以小柴胡湯與之不驗又以大柴胡湯與之亦不效又增大柴胡湯大劑大便通下燥屎得愈乃誇曰果不須大承氣予笑曰公苟圖目前而不知貽禍於後病雖瘥必作瘡瘍之證後半月忽體生赤瘡次日背發腫如盤堅如石痛不堪忍渠以爲背疽憂甚急召予予曰瘡瘍之證也若當日服承氣今無此患矣治以數日瘥或者問何以知其瘡瘍之證予曰仲景云跌陽脈滑而緊者胃氣實脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刃坐作瘍蓋病勢有淺深藥力有輕重治者必察其病者如何耳疾勢深則以重劑與之疾勢輕則以輕劑與之正如持衡緡銖不偏也不然焉用七方十劑今病人毒邪如此深須藉大黃朴硝蕩滌藏府經絡毒氣利三二行則邪毒皆去今醫小心謹慎又不能了了見得根源但以大柴胡得屎因謂大便通行便得安瘥不知遺禍於後必瘡瘍當時若聽予言豈有斯患

面垢惡寒證七十五。

一尼病頭痛身熱煩渴躁。診其脈大而虛。問之曰小便赤。背惡寒。毛竦洒洒然。面垢中暑也。醫作熱病治。但未敢服藥。予投以白虎湯。數日愈。

論曰仲景云脈虛身熱。得之傷暑。又云其脈弦細芤遲何也。素問曰寒傷形。熱傷氣。蓋傷氣不傷形。則氣消而脈虛弱。所以弦遲芤細。皆虛脈而可知矣。

傷寒下利證七十六。

呂商得傷寒。自利腹滿。不煩。不渴。嘔吐。頭痛。予診趺陽脈大而緊。曰太陰證也。若少陰下利必渴。今不渴。故知太陰證。仲景云自利不渴屬太陰。調治數日愈。

論曰或問傷寒何以診趺陽。予曰仲景稱趺陽脈大而緊者。當卽下利。脈經云下利脈大爲未止。脈微細者今日愈。仲景論趺陽脈九十一處。皆因脾胃而設也。且如稱趺陽脈滑而緊。則曰滑乃胃實。緊乃脾弱。趺陽脈浮而濇。則曰浮爲吐逆。水穀不化。濇則食不得入。趺陽脈緊而浮。浮則腹滿。緊則絞痛。趺陽脈不出。則曰脾虛。上下身冷。膚硬。則皆脾胃之設可知矣。大抵外證。腹滿自利。嘔惡吐逆之類。審是病在脾胃。而又參決以趺陽之脈。則無失矣。其脈見於足趺之陽。故曰趺陽。仲景譏世人握手而不及足。

傷寒閉目證七十七。

李思順得傷寒。惡寒發熱。口中氣熱如火。不□七八日矣。而目閉不肯開。予診其脈。陰陽俱緊。是必汗之

而復下之故也此壞證矣病家曰一醫於三日前汗之不愈一醫復下之而目閉矣遂投以小柴胡湯五啜而愈

論曰或者何以知其汗下而目閉予曰仲景稱傷寒發熱口中氣勃勃然頭痛目黃若下之則目閉又云傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱目赤脈多睛不慧醫復汗之咽中傷若復下則兩目閉此壞證須小柴胡湯調之愈

傷寒表實證七十八

羽流病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此表實證也當汗之以麻黃輩數日愈

論曰或問傷寒因虛故邪得以入之今邪在表何以爲表實也予曰古人稱邪之所湊其氣必虛留而不去爲病則實蓋邪之入也始因虛及邪居中反爲實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可坐而定也何以明之有表實有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實百證歌中嘗論之矣仲景麻黃湯類爲表實而設也桂枝湯類爲表虛而設也裏實承氣之類裏虛四逆理中之類表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈也表裏俱虛所謂陰盛陽虛汗之則愈也

手足逆冷證七十九

酒家朱三者得傷寒六七日自頸以下無汗手足厥冷心下滿大便祕結或者見其逆冷又汗出滿悶以爲陰證予診其脈沉而緊曰此證誠可疑然大便結者爲虛結也安得爲陽脈雖沉緊爲少陰證然少陰

證多矣。是自利未有祕結。予謂此半在表。半在裏也。投以小柴胡湯。大便得通而愈。

論曰傷寒。惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞕。脈細者。此爲陽微結。必有表復有裏也。脈沉亦在裏也。汗出爲陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此爲半在表半在裏也。脈雖沉緊。不得爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。得屎而解也。難者曰仲景云病人脈陰陽俱緊。及汗出者。亡陽也。此屬少陰。今云陰不得有汗。何也。今頭汗出。故知非少陰也。何以頭汗出。則知非少陰。予曰此說正是議論處。謂四肢冷。脈沉緊。腹滿。全是少陰。然大便硬。頭汗出。不得謂少陰。蓋頭者三陽所聚。三陽自胷中而還。有頭汗出。自是陰虛。故曰汗出爲陽微。是陰不得有頭汗也。若少陰有頭汗。則九死一生。故仲景平脈法云。心者火也。名火陰。其病頭無汗者可治。有汗者死。心爲手少陰。腎爲足少陰。然相與爲病。以意逆志。是謂得之。

寒熱類傷寒證八十

一尼病。惡風。體倦。乍寒乍熱。面赤心煩。時或有汗。他醫以傷寒溫瘧治之。見其寒熱往來。時方疫氣大作也。大小柴胡雜進。數日愈甚。轉劇。予診之曰。兩手不受邪。厥陰脈弦長而上魚際。此非傷寒。乃陰動不得陽也。此正與倉公治一繡女病同。投以抑陰等藥。數日愈。

論曰昔褚澄云。治師尼寡婦別製方。蓋有爲也。師尼寡婦獨居怨曠。獨陰而無陽。欲心屢萌。而不適其慾。是以陰陽交爭。乍寒乍熱。虛汗倦怠。全類溫瘧。久久成癆瘵矣。嘗記史書倉公傳載。濟北王侍者繡女病。

腰背寒熱。衆醫皆爲寒熱也。倉公曰病得之欲男子而不可得也。何以知之。診其脈。肝部弦出寸口。是以知也。男子以精爲主。女子以血爲主。男子精溢則思室。女子血盛則懷胎。肝攝血者也。今肝脈弦長上寸口及魚際。則血盛欲男子之候也。然則治師尼寡婦猶不可與尋常婦人一概論也。

失汗衄血證八十一。

里人秦氏子得傷寒。發熱。身疼。骨節疼痛。惡風無汗。或者勸其不須服藥。待其自安。如是半月矣。而病不除。不得已召醫治之。醫至問日數。又不審其脈與外證。但云已過期矣。不可汗下矣。且與調氣藥以正氣。復延予予診其脈浮濇而緊大。此麻黃證無疑者。但恐當汗不汗。化爲衄血。必有是證。言未已。衄血作。予急以麻黃湯與之。繼之以犀角地黃湯。血止汗解愈。

論曰仲景云凡作湯藥。不可避晨夜。覺病須臾。即宜便治。不等早晚。則易愈。或稍遲。病即傳變。雖欲除必難爲力。今醫不究根源。執以死法。必汗之於四日之前。下之於四日之後。殊不知此惑也。又云病不服藥。猶得中醫。此爲無醫而設也。若大小便不通。必待其自瘥乎。蓋前後不得溲。必下部腹脹。數日死矣。又況結胷蓄血。發狂發斑之類。未有勿藥而愈者。知者知變。愚者執迷。以取禍也。須是隨病淺深。在表在裏。或陰或陽。早爲治療。如救火及溺。然庶易瘥。素問云邪風之至。疾如風雨。故善治者治皮毛。其次治肌膚。其次治筋脈。其次治六腑。其次治五臟。治五臟者半死半生也。扁鵲望齊侯而逃。其斯之謂歟。

一豪子郭氏得傷寒數日身熱頭疼惡風大便不通臍腹膨脹易數醫一醫欲用大承氣一醫欲大柴胡一醫欲用蜜導病家相知凡三五人各主其說紛然不定最後請予至問小便如何病家云小便頻數乃診六脈下及跌陽脈浮且澀予曰脾約證也此屬太陽陽明仲景云太陽陽明者脾約也仲景又曰跌傷脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則鞕其脾爲約者大承氣大柴胡恐不當仲景法中麻仁丸不可易也主病親戚尙爾紛紛予曰若不相信恐別生他證請辭無庸召我坐有一人乃弟也逡巡曰諸君不須紛爭既有仲景證法相當不同此說何據某雖愚昧請終其說諸醫若何各請敍述衆醫默默紛爭始定予以麻仁丸百粒分三服食頃間盡是夕大便通中汗而解

論曰浮者風也澀者津液少也小便頻數津液枯竭又爍之以風是以大便堅鞕乃以大黃朴硝湯劑蕩滌腸胃雖未死恐別生他證當讀千金方論腳氣云世間人病有親戚故舊遠近問病其人曾不經一事未讀一方騁騁詐作明能詭論或言是虛或言是實或以爲風或以爲蟲或道是水或道是痰紛紛謬說種種不同破壞病人心意莫知孰是遷延未定時不待人忽然致禍各自走散凡爲醫者要識病淺深探頤方書博覽古今是事明辨不爾大誤人事識者宜知以爲醫戒

格陽關陰證八十三

張養愚患傷寒八九日以上吐逆食不得入小便痓悶不通醫作胃熱而吐傳入膀胱則小便不通也予診其脈見寸上二溢而尺覆關中伏而不見乃斷之曰格陽關陰證也陽溢於上不得下行陰覆於下不

得上達中有關格之病是以屢汗而不得汗也予投以透膈散三啜而吐止小便利而解

論曰或問何謂格陽關陰答曰難經云關以前動者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陰乘之脈也又曰陰氣太盛陽氣不得營故曰關陽氣太盛陰氣不得營故曰格陰陽俱盛不能相營也故曰關格關格者不得盡期而死矣素問曰人迎四盛以上爲格陽寸口四盛以上爲關陰人迎與寸口俱盛四倍以上爲關格仲景云在尺爲關在寸爲格關則小便不利格則吐逆又跌陽脈浮而澀伏則吐逆水穀不化澀則食不得入名曰關格由是言之關脈沉伏而澀尺寸有覆溢者關格病也何以言之天氣下降地氣上升在卦爲泰泰者通也天氣不降地氣不升在卦爲否否者閉也今陽不降上魚際爲溢故其病吐逆名爲外格陰不得上浮入尺爲覆故其病小便不通爲內關此關格之異也

太陽陽明合病證八十四

有豪子病傷寒脈浮而長喘而胷滿身熱頭疼腰脊強鼻乾不得眠予曰太陽陽明合病證仲景法中有三證下利者葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胷滿者麻黃湯也治以麻黃湯得汗而解

論曰或問傳入之次第自太陽陽明少陽太陰少陰厥陰何哉說者謂陽主生故足太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪陰主殺故太陰土傳少陰水水傳足厥陰木爲賊邪少陰水傳厥陰木安得爲賊也故予以爲不然素問陰陽離合論云太陽根起于至陰結于命門名曰陰中之陽陽明根起于厲兌名

曰陰中之陽。少陽根起于竅陰。名曰陰中之少陽。太陰根起于隱白。名曰陰中之陰。少陰根起于涌泉。名曰陰中之少陰。厥陰根起于大敦。名曰陰之絕陰。大抵傷寒始因中之氣得之于陰。是以止傳足經者。是陰中之陽。陽中之陰。亦自然之次第也。故此篇因黃帝問三陰三陽之離合。岐伯自聖人南面而立前曰廣明而推之。且以太陽爲開。陽明爲闔。少陽爲樞。太陰爲開。厥陰爲闔。少陰爲樞。六經不得相失。則其序有授矣。不特此也。以六氣在天而考之。厥陰爲初之氣。少陰爲二之氣。太陰爲三之氣。少陽爲四之氣。陽明爲五之氣。太陽爲六之氣。此順也。逆而言之。則太陽而後陽明。陽明而後少陽。少陽而後太陰。太陰而後少陰。少陰而後厥陰。傷寒爲病。在氣則逆而非順。自太陽而終厥陰也。

懊憹佛鬱證八十五。

士人陳彥夫病傷寒八九日。身熱無汗。喜飲。時時譫語。因下利後。大便不通三日。非煩非躁。非寒非痛。終夜不得眠。但心沒曉會處。或時發一聲如歎息之狀。醫者不曉是何證。但以寧心寬膈等藥不效。召予診視。兩手關脈長。按之有力。乃曰懊憹佛鬱證也。此胃中有燥屎。宜與承氣湯服之。下燥屎二十枚。次復下溏糞。得利而解。

論曰。仲景云陽明病下之。心中懊憹而微煩。胃中有燥屎可攻。宜承氣湯。又云病者小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。佛鬱不得眠者。有燥屎也。承氣湯主之。蓋屎在胃則胃不和。素問曰胃不和則臥不安。此所以夜不得眠也。仲景云胃中燥。大便堅者。必譫語。此所以時時譫言也。非煩非燥。非寒非痛。所謂心中

懊憹也。聲口歎息而時發一聲。所謂水氣怫鬱也。燥屎得除。大便通利。陰陽交和。是以其病得除。

兩手撮空證八十六。

市人張某年可四十。病傷寒。大便不利。日晡發熱。手循衣縫。兩手撮空。目直視急。更三醫矣。皆曰傷寒最惡證也。不可治。後召予。予不得已往診之。曰此誠惡候。染此者十中九死。仲景雖有證而無治法。但云脈弦者生。澀者死。況經吐下。難于用藥。謾以藥與。若大便得通。而脈強者。庶可料理也。遂用小承氣湯與之。一投而大便通利。諸疾漸退。漸退脈且微弦。半月得瘥。

論曰或問下之而脈得弦者生。何也。答曰金匱玉函經云循衣摸牀。妄撮。怵惕不安。微喘直視。脈弦者生。澀者死。微者但發熱譫語。承氣湯與之。余嘗觀錢仲陽小兒訣法。手循衣領。及亂捻物者。肝熱也。此證玉函列在陽明部。陽明胃也。肝有邪熱。淫于胃經。故以承氣湯瀉肝。而得強脈。則平而和。胃且堅不受。此百生之理也。予嘗謂仲景論。不通諸醫書。以發明隱奧。而專一經者。未見其能也。須以古今方書。發明仲景餘意。

下利服承氣湯證八十七。

客有病傷寒。下利。身熱。神昏多困。譫語。不得眠。或者見其下利。以譫語爲鄭聲。皆陰虛證也。予診其脈曰此承氣湯證也。衆皆愕然曰下利服承氣。仲景法乎。答曰仲景云下利而譫語者。有燥屎也。屬小承氣湯。乃投以小承氣。得利止。而下燥屎十二枚。俄得汗解。

論曰內經云徵者逆之甚者從之逆者正治從者反治從少從多觀其事也帝曰何謂反治岐伯曰寒因寒用通因通用王冰以爲大熱內結注瀉不止熱宜寒療結伏須除以寒下之結散利止此寒因寒用也小承氣止利正合此理

溼溫證八十八

丙午歲商人張皓季夏得疾胷項多汗四肢時冷頭痛譫語予診其脈關前濡關後數斷曰當作溼溫治蓋先受暑後受溼暑溼相搏是謂溼溫投以白虎加參次以白虎蒼朮頭痛漸退足漸溫汗漸止數日愈此病名賊邪誤服藥則死

論曰或者難云何謂賊邪予曰難經論五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者爲虛邪從前來者爲實邪從所不勝者爲賊邪從所勝者爲微邪自病者爲正邪又曰假令心病中暑者爲正邪中溼得之爲賊邪今心先受邪而溼勝之水尅火從所不勝斯爲賊邪五邪之最逆者也難經有云溼溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部溼氣搏暑也小急見於陰部暑氣溼蒸也故經曰暑溼相搏名曰溼溫是爲賊邪也

血結胷證八十九

丁未歲一婦患傷寒寒熱夜則譫語目中見鬼狂躁不寧其夫訪予詢其治法予曰若經水適來適斷恐是熱入血室也越日亟告曰已作結胷之狀矣予爲診之曰若相委信急行小柴胡湯等必愈前醫不識

涵養至此。遂成結胸證。藥不可及也。無已。則有一法。刺期門穴。或庶幾愈。如教而得愈。

論曰。或問熱入血室。何爲而成結胸。予曰。邪入經絡。與正氣相搏。上下流行。或遇經水適來適斷。邪氣乘虛而入血室。血與邪迫。上入肝經。肝既受邪。則譫語如見鬼。肝病則見鬼。目昏則見鬼。復入膻中。則血結於胸也。何以言之。蓋婦人平居。經水常養於目。血常養肝也。方未孕。則下行之以爲月水。既妊娠。則中蓄之以養胎。及已產。則上壅。得金化之以爲乳。今邪逐之併歸肝經。聚於膻中。壅於乳下。非刺期門以瀉。不可也。期門者肝之膜原。使其未聚於乳。則小柴胡尙可行之。既聚於乳。小柴胡不可用也。譬如凶盜行於閭里。爲巡邏所迫。寡婦處女適啓其門。突入其室。婦女爲盜所迫。直入陰奧。以避之。盜躡其蹤。必不肯出。乃啓孔道以行。誘焉。庶幾其可去也。血結於胸。而刺斯門。何以異此。

六陽俱絕證九十一

一達官乘舟悉歸。四月風雨。飲食不時。得疾。如傷寒狀。頭重自汗。身體悉疼。醫作中風溼證治。投以朮附薑附等湯。汗不止。單服附子。及灸臍下。亦不止。予往視之。曰六陽俱絕。不可治也。（其汗必如珠。驗之果然。半時卒。）論曰。難經云六俱氣俱絕者。陰與陽相離。陰陽相離。則腠理開。絕汗乃出。汗出如珠。轉而不流。夕占旦死。旦占夕死。此之謂也。蓋病者之汗。有陽盛陰虛。陰盛陽虛。陽盛者。如骨蒸熱病之汗。則流溢如潤。陽絕者。如此證。則凝聚而止。假如甑餾之蒸物。出汗而散者。陽盛之類也。假如置冰於金銀瓦器中。汗出而凝聚不流。陽絕之證也。

傷寒九十論校譌

是書世無刊本。醫家得之。奉爲枕中祕。余屢欲刊行。又以原鈔多舛誤處。未得善本校正。人命攸關。非細事也。今夏與徐丈稼甫。江君彤甫。繙閱他書。糾正數處。而彤甫復不敢自信。知貝君靜安素習是道。攜往質之。貝君更爲曲證旁參。於是殆可以無憾矣。間有疑似附錄於後。咸豐三年十一月仁和胡珽識。

目錄一頁十二行 文煒按剛痙原作剛痓。今从舊本仲景傷寒論改。

二頁七行 文煒按吃遜素同唵。

三頁五行 班字誤。原作斑。

本書一頁六行 文煒按尙字據下文當作兆。 八行 毓誠按通順血脈以下出宏景別錄。

二頁一二兩行 附字誤。原作附子。 十行 文煒按有當作者。

三頁三行 捐字誤。原作損。 七行 文煒按而當作尙。

八頁二行 已字誤。原作巳。

九頁六行 文煒按京當作京繩。

十一頁四五兩行 毓誠按蛔字成注傷寒作蚘。文煒按舊本仲景論亦作蚘。下第九行同。

十四頁七行 毓誠按但字當作使。

十六頁十行　原作壞字誤。

十七頁八行　原作尿字誤。

十八頁八行　戴校按。謂當作爲。九行　文煒按。由當作內。

二十頁三行　原作醫字誤。四行　戴校按。陽當作陰。五行　下戴當有氣字。

二十一頁六行　戴校按。搏字經亦有作摶聚之摶。十一行　文煒按。水壹當作外臺。戴校曰。外臺是也。差文煒謂蒿字必訛。疑爲高字。夏有高乃人之姓。字也。戴校謂或是篙字。篙師習於水。故多潛。又黃爲溼熱。溼於夏也。蹉按。若如貝君所言。則當爲篙工。十五行　高原作蒿。

二十三頁七行　戴校按。方當作方。爲謂

二十五頁十四行　原作令字誤。今令。

二十七頁十二行　卹从刃字下同。不从卩。得聲。十五行　眴字誤。原从目旁作眴。

三十一頁四行　原作朘字誤。晚字誤。

三十二頁十一行　原作跌字誤。跌

三十四頁十五行　戴校按。陽當作陰。

三十五頁六行　戴校按。硬當作鞕。

三十六頁三行　文煒按。猶當作尤。

三十七頁三行　原作趺字誤。九行　文煒按。當字疑嘗字之訛。十二行　原作嘖。頭字誤。

三十八頁六行跌字誤。原作跌。六行人字誤。原作入。

三十九頁二行作火敦誤。原作大敦。

四十頁六行復漸退二字。當勾去。

四十一頁十一行搏字誤。原作搏。

四十二頁十三行六俱誤。原作六陽。

傷寒九十論續校

會稽鏡吾氏董金鑑輯

目錄二頁八行校讎云剛痙原作剛痓今改按痙充自切痙其并切方書並訓肴強瘛瘲二字義本相近。

本書二頁十五行小字誤原作少。

三頁五行羞字誤原作差。

五頁一行牀字誤原作狀。

五頁七行冤冕當作猶懊懊冤煩也。

八頁二行處字誤原作慮。四行不字誤原作下。十行氣出據上文當作氣熱再攷仲景論校正。

九頁十二行○下之二字似不應複。藥當作丸觀下論可知。

十頁九十兩行案字別下文十一行几音殊殳字尟字並从之與几几亦同。

十二頁四行胍字誤原作脈。

三十二頁七行服字誤原作腹。十三行緇字誤原作錙。

三十四頁三行或者當作或問。

三十七頁三行傷當作陽。十行騁騁至詭論此八字有誤。

三十八頁六行浮當作伏觀下文可知。

四十二頁八行斯字誤。悉字誤。原作期。十行原作急。

附補校

本書一頁九行○通順句應加。○見校讎。捐字應加。

三頁三行○見校讎。

九頁十三行當有止字。溏利下疑

十四頁十四行繫音蟄。繫汗出貌。繫

二十三頁三行有誤。謂字

二十五頁十三行一熱字。寒下疑衍

十四行校讎云。今當作令。按今字文義不誤。校讎疑互倒。

王雲五主編

叢書集成初編

傷寒微旨論及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠

（本書校對者滕秉全楊伯屏）

E五四一四上　祥